



Gebruikershandleiding voor zorgverleners in de verloskunde



Gebruikershandleiding Dataset Perinatologie 2.3 versie 1.10

Versienummer	Publicatiedatum
Gebruikershandleiding 1.0	--- -----
Gebruikershandleiding 1.1	n.v.t.
Gebruikershandleiding 1.2 Aanpassingen op 04-05-2021	vanaf 01-01-2021
Gebruikershandleiding 1.3 Aanpassingen op 25-06-2021	vanaf 25-06-2021
Gebruikershandleiding 1.4 Aanpassingen op 05-09-2021	vanaf 05-09-2021
Gebruikershandleiding 1.5 Aanpassingen op 01-01-2022	vanaf 01-01-2022
Gebruikershandleiding 1.6 Aanpassingen op 27-04-2022	vanaf 27-04-2022
Gebruikershandleiding 1.7 Aanpassingen op 26-05-2022	vanaf 26-05-2022
Gebruikershandleiding 1.8 Aanpassingen op 04-06-2022	vanaf 04-06-2022
Gebruikershandleiding 1.9 Aanpassingen op 30-03-2023	vanaf 30-03-2023
Gebruikershandleiding 1.10 Aanpassingen op 28-05-2023	vanaf -- -- ----

Gebruikershandleiding Dataset Perinatologie 2.3 versie 1.10

Introductie:

Om te komen tot een eenduidige uitwisseling van gegevens tussen de verschillende systemen (Orfeus - Onatal - Vrumun - Chipsoft - etc) van de verloskundig zorgverleners in Nederland zijn drie onderdelen heel belangrijk:

- 1) De computers (Systemen) moeten onderling verbonden zijn. Hiervoor is Babyconnect in het leven geroepen. Zij zorgen dat de onderlinge verbinding tot stand komt:
<https://babyconnect.org/>
- 2) Alle systemen moeten dezelfde taal spreken. Hiervoor zorgt de Expertgroep Eenheid van Taal. Zij hebben heel veel onderdelen binnen de verloskunde, de kindergeneeskunde en de kraamzorg opnieuw bekeken, benoemd en van een Snomed code voorzien. Hierdoor kan het niet meer voorkomen dat de ene computer niet weet wat de andere bedoeld. Omdat alle koepels (KNOV - NVOG - NVK - BO geboortezorg etc.) het belang hiervan in zagen is het uiteindelijk een Informatiestandaard geworden waardoor alle verloskundige systemen hier mee gaan werken.
- 3) Het is fijn als de systemen ook op dezelfde wijze worden ingevuld. Hiervoor is deze handleiding bedoeld. Als u even niet weet hoe nu verder te gaan kunt u deze raadplegen. Als iedereen zo veel mogelijk op dezelfde manier gaat invullen zal dit de zorg ten goede komen en daarnaast ook betrouwbaardere cijfers gaan opleveren.

De handleiding is een levend document waar constant aan gewerkt wordt en eigenlijk nooit klaar is. Toch is besloten om vast het eerste deel (versie 1.0) te publiceren. De gebruikershandleiding is geschreven op geleide van de NICTIZ geboortezorg dataset perinatologie 2.3 en staat derhalve niet altijd in een logische volgorde. (Lees: het staat soms door elkaar) Door echter binnen het document de knoppen Ctrl + f tegelijk in te drukken kunt u zoeken naar de woorden die u nodig heeft. Het belangrijkste voor de zorgverlener is het invul advies, daar staat wat bedoeld wordt.

Voor u als zorgverlener is het van belang dat u weet met welke versie van het handboek u aan het werk bent. Daarom zullen we aangeven wanneer de verschillende versies gepubliceerd zijn zodat u kunt zien of u de meest recente versie heeft.

Naam	Nummer	Invuladvies
Zorgverlening	Peri23-dataelement-4	
Datum start zorg-verantwoordelijkheid	peri23-20290	Vul hier de datum van Overname van Zorg van de patiënt in. We spreken van start zorg- verantwoordelijkheid als de patiënte in de wachtkamer of wachtruimte op haar afspraak met de arts, verpleegkundige, assistente of andere zorgverlener wacht, of als tevoren (telefonisch) over de specifieke patiënt medisch advies gegeven is.
Datum einde zorg-verantwoordelijkheid	peri23- 20340	Vul hier de <u>exacte</u> datum in van dag waarop de zorg voor de patiënt is overgenomen door een andere zorginstelling, of de zorg in zijn geheel beëindigd is. (Dus <u>niet</u> de datum van verwijzing, behalve als de datum van verwijzing en overname dezelfde zijn.) Als je, als ziekenhuis b.v., niet het kraambed verzorgt, kies dan niet voor einde zorg 6 weken postpartum , maar de datum van ontslag/overdracht.
Eindverantwoordelijk in welke perinatale periode?	peri23-20355	Kies uit de waardelijst de juiste perinatale periode waarin de zorginstelling eindverantwoordelijk was. Hier wordt bedoeld de perinatale periode waarin er sprake was van een behandelovereenkomst. Let op u kunt meerdere perioden aanvinken.
Conclusie risicostatus na intake	peri23-20305	Vul hier in hoe u de risicostatus van uw patiënt inschat direct na de intake, het afnemen van de anamnese of het MDO. Let op: Iemand met een sectio in de anamnese is een VIL B. Iemand met een Antibioticaprofylaxe durante partu een VIL D als de 1 ^e lijn de partus doet maar VIL C als de 2 ^e lijn de partus doet. NB: Bent u de tweede of derde zorgverlener? Vul hier dan niets in.
Verwijsdetails	peri23-82012	
Datum verwijzing	peri23-82013	Vul hier de exacte datum in van de dag waarop u uw zorgverzoek voor de patiënt heeft verstuurd. Dus de datum van verwijzing voor consult of overname
Zorgverzoek gedaan door	peri23-dataelement-20314	Registreer hier door wie het zorgverzoek gedaan is, dat kan u zelf zijn maar ook de patiënt of een zorginstelling.
Verwijzing van	Peri23-82550	

Zorginstelling	peri23-82551	
Zorgaanbieder identificatienummer	peri23-82552	U hoeft hier niets in te vullen. Het identificatienummer van uw organisatie wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Specialisme	peri23-82554	Kies uit de waardelijst het juiste specialisme van de verwijzende zorgverlener.
Verwijzing naar	peri23-82577	
Zorginstelling	Peri23-82578	
Zorgaanbieder Identificatienummer	peri23-82579	Vul eerst de naam van de zorginstelling in naar wie u verwijst en uw systeem zal dit nummer automatisch invullen.
Specialisme	peri23-82580	Kies uit de waardelijst het juiste specialisme van de zorgverlener waarnaar u verwijst.
Type verwijzing	peri23-82581	Gaat het om een consult of een overname? De verwijzende partij, u dus, bepaalt bij een verwijzing na overleg met de ontvangende partij, of het een consult of overname betreft. Indien consult resulteert in een nieuwe verwijzing dan dient u een nieuwe verwijzing aan te maken. Let op: denk aan het invullen van de datum einde zorg- verantwoordelijkheid
Reden van verwijzing	peri23-82014	
Categorie reden (acute overdracht)	peri23-20372	wat is de reden waarom acuut wordt overgedragen?
Verwijzing van 1e naar 2e lijn	peri23-82450	
Algemene anamnese	Peri23-82454	

Auto-immuun aandoening	Peri23-82456	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op kijk ook in andere groepen. Crohn bijvoorbeeld staat onder MDL aandoening
Cardiovasculaire aandoening	Peri23-82458	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Urogenitale aandoening	Peri23-82460	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Oncologische aandoening	Peri23-82462	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Schildklier aandoening	Peri23-82464	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Diabetes mellitus?	Peri23-82465	Vul hier Ja in als er sprake is van diabetes mellitus (type I of type II) Kies anders voor nee Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet om zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.
Neurologische aandoening	Peri23-82467	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Infectieziekte	peri23-82469	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
MDL aandoening	peri23-82471	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Anemie	peri23-82473	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Longaandoening	peri23-82475	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Gynaecologische aandoening	peri23-82477	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Vermeld worden, pre existente gynaecologische aandoeningen, met mogelijke consequenties voor de zwangerschap
Orthopedische afwijking	peri23-82479	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.

Bloedtransfusie?	peri23-82481	Vul hier Ja in als er sprake is van een bloedtransfusie. Kies anders voor Nee. Denk ook aan de bloedtransfusie gegeven tgv een fluxus post partum. Ook dan kiest u voor "Ja"
Transfusiereactie?	peri23-82482	Vul hier Ja in, indien er sprake is van een transfusiereactie. kies anders voor Nee.
Type operatie	peri23-82484	Kies uit de waardelijst de juiste operatie die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Type stollingsprobleem	peri23-82486	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in andere groepen voorkomen.
Psychiatrie	peri23-82488	Vul hier ja in indien er sprake is van een psychiatrische aandoening. Kies anders voor Nee. Kies alléén Ja bij de <u>gediagnosticeerde</u> psychiatrische aandoeningen niet bij psychosociale problemen
Overige aandoening?	peri23-82490	Vul hier Ja in indien er sprake is van een overige aandoening. Kies anders voor Nee
Obstetrische anamnese	peri23-82492	Met een verwijzing worden zowel verwijzingen als consulten bedoeld.
Gynaecologische aandoening	Peri23-82582	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Bloedverlies	peri23-82493	Vul hier Ja in als ergens in een zwangerschap bloedverlies heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee
Partiële mola?	peri23-82494	Vul hier Ja in indien in een zwangerschap sprake was van een partiële mola Kies anders voor Nee.
Cervixinsufficiëntie?	peri23-82495	Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van cervixinsufficiëntie. Kies anders voor Nee. Kijk voor de definitie van Cervixinsufficiëntie naar de omschrijving hierover binnen uw eigen VSV
Infectie	peri23-82496	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Hyperemesis Gravidarum?	peri23-82497	Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van hyperemesis gravidarum, kies anders voor Nee. Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van misselijkheid en braken in de zwangerschap die samengaat met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.

Hypertensieve aandoening	peri23-82498	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Zwangerschapscholestase?	peri23-82499	Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van zwangerschapscholestase. Kies anders voor Nee. Een zwangerschapscholestase is een aandoening gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met een verhoogde concentratie van random serum galzuren. (NVOG richtlijn 2018)
Diabetes Gravidarum met insuline ?	peri23-82500	Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van diabetes gravidarum met insuline. Kies anders voor Nee.
Afwijkende groei foetus	peri23-82501	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Dreigende partus immaturus?	peri23-82502	Vul hier ja in indien in een zwangerschap een opname is geweest wegens een dreigende partus immaturus. Een partus immaturus is gedefinieerd als er een partus tussen 16w0d tot en met 27w6d.
Dreigende partus prematurus?	peri23-82503	Vul hier ja in indien in een dreigende partus prematurus Kies anders voor Nee. Een partus prematurus is gedefinieerd als er een partus tussen 28w0d tot en met 36w6d.
Abruptio placentae?	peri23-82504	Vul hier Ja in indien in een zwangerschap sprake was van een Abruptio Placentae. Kies anders voor Nee. Een abruptio placentae is een voortijdige geheel of gedeeltelijke loslating van de placenta.
Fluxus postpartum?	peri23-82505	Vul hier ja in indien in een zwangerschap sprake was van een Fluxus postpartum. Kies anders voor Nee. Er is sprake van een (ernstige) fluxus postpartum wanneer er binnen 24 uur na geboorte van het kind meer dan 1000 ml bloedverlies is.
Zwangerschap	peri23-82506	
Gynaecologische aandoening	Peri23-82509	Kies uit de waardelijst de juiste gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap die van toepassing is.
Bloedverlies?	peri23-82510	Vul hier Ja in als ergens in de huidige zwangerschap bloedverlies heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee
Partiële mola?	Peri23-82511	Vul hier Ja in indien er sprake van een partiële mola met intacte zwangerschap. Kies anders voor Nee. We spreken

		van een partiële mola als er sprake is van een mola samen met een intacte zwangerschap Let op een mola wordt geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.
Cervixinsufficiëntie?	peri23-82512	Vul hier Ja in indien er sprake is van een cervixinsufficiëntie. Kies anders voor Nee. Kijk voor de definitie van Cervixinsufficiëntie naar de omschrijving hierover binnen uw eigen VSV
Infectie	peri23-82513	Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van toepassing is.
Hyperemesis Gravidarum?	peri23-82514	Vul hier Ja in, indien er sprake is van hyperemesis gravidarum. Kies anders voor Nee. Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van misselijkheid en braken in de zwangerschap die samengaat met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.
Hypertensieve aandoening	peri23-82515	Kies uit de waardelijst de juiste Hypertensieve aandoening.
Zwangerschaps-cholestase?	peri23-82516	Vul hier Ja in, indien er sprake is van zwangerschapscholestase Kies anders voor Nee. Een zwangerschapscholestase is een aandoening gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met een verhoogde concentratie van random serum galzuren. (NVOG richtlijn 2018)
Diabetes Gravidarum met insuline ?	peri23-82517	Vul hier Ja in indien er sprake is van diabetes gravidarum met insuline. Kies anders voor Nee.
Afwijkende groei foetus	peri23-82518	Kies uit de waardelijst de juiste afwijkende groei van de foetus.
Dreigende partus immaturus?	peri23-82519	Vul hier Ja in indien er sprake is van een dreigende partus immaturus. Kies anders voor Nee. Een dreigende partus immaturus is gedefinieerd als er een partus dreigt tussen 16w0d tot en met 27w6d.
Dreigende partus prematurus?	peri23-82520	Vul hier Ja in indien er sprake is van een dreigende partus prematurus. Kies anders voor Nee. Een dreigende partus prematurus is gedefinieerd als er een partus dreigt tussen 28w0d tot en met 36w6d.
Abruptio placentae?	peri23-82521	Vul hier Ja in indien er sprake is van een Abruptio placentae. Kies anders voor Nee. Een abruptio placentae is een voortijdige geheel of gedeeltelijke loslating van de placenta.
Navelstrengprolaps?	Peri23-82522	Vul hier Ja in indien er sprake is van een navelstrengprolaps. (uitgezakte navelstreng) Kies anders voor Nee.

Liggingsafwijking	peri23-82523	Kies uit de waardelijst de juiste liggingsafwijking in de huidige zwangerschap: Vanaf 36+0 dagen weken is iedere ligging anders dan 'hoofdligging' een afwijkende ligging.
Intra-uterine vruchtdood	peri23-82524	
Vermoeden intra-uterine vruchtdood?	peri2382525	Vul hier Ja in indien er sprake is van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.
Vermoeden IUVD op basis van	peri 23-82526	Kies uit de waardelijst de juiste wijze van vaststelling van het vermoeden van de intra-uteriene vruchtdood.
Einde zwangerschap	peri23-82453	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de zwangerschap geëindigd is. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is. In het geval van een meerling wordt er maar één partus geregistreerd, Ook als beide kinderen op een ander adres geboren zijn en/of de geboortedatum van beide kinderen een of meerdere dagen uit elkaar liggen.
Bevalling	peri23-82527	
PPROM?	peri23-82530	Vul hier Ja in indien er sprake is van PPRM. Kies anders voor Nee. PPROM = Spontaan breken van vliezen zonder weeën tot een uur na het breken van de vliezen, tot en met een zwangerschapsduur van 36w6d.
PROM?	peri23-82531	Vul hier Ja in indien er sprake is van PROM. Kies anders voor Nee. PROM is het breken van de vliezen zonder weeën tot een uur na het breken van de vliezen bij een zwangerschapsduur vanaf 37wk0d.
Koorts?	peri23-82532	Vul hier Ja in indien er sprake is van koorts. Kies anders voor Nee.: We spreken van koorts bij een temperatuur > 38 graden Celsius.
Niet vorderende ontsluiting?	peri23-82533	Vul hier Ja in indien er sprake is van niet vorderende ontsluiting. Kies anders voor Nee. We gebruiken voor het vaststellen van niet vorderende ontsluiting de vigerende KNOV richtlijn.
Niet vorderende uitdrijving?	peri23-82534	Vul hier Ja in indien er sprake is van niet vorderende uitdrijving. Kies anders voor Nee. Voor het vaststellen van een niet vorderende uitdrijving wordt verwezen naar de vigerende NVOG richtlijn vaginale kunstverlossing.

Verdenking foetale nood?	peri23-82535	Vul hier Ja in indien er sprake is van een verdenking van foetale nood. Kies anders voor Nee. Er is verdenking foetale nood bij onder andere: Meconiumhoudend vruchtwater en/of cortonen pathologie
Intra-uterine vruchtdood	peri23-82536	
Vermoeden intra-uterine vruchtdood?	peri23-82537	Vul hier Ja in indien er sprake is van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.
Vermoeden IUVD op basis van	peri 23-82526	Kies uit de waardelijst de juiste wijze van vaststelling van het vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood.
Vastzittende placenta?	peri23-82541	Vul hier Ja in indien er sprake is van een vastzittende placenta. Kies anders voor Nee. Een placenta zit vast wanneer deze langer dan een uur na de geboorte van het kind nog niet geboren is.
Conditie perineum postpartum.	peri23-82543	Vul hier Ja in als de schade aan het perineum (postpartum) de reden is om de patiënt naar de 2 ^e lijn te verwijzen. Kies anders voor Nee
Fluxus postpartum?	peri23-82542	Vul hier Ja in als er sprake is van een fluxus postpartum. Kies anders voor Nee. Er is sprake van een (ernstige) fluxus postpartum wanneer er binnen 24 uur na geboorte van het kind meer dan 1000 ml bloedverlies is.
Postnatale fase	peri23-82544	
Pathologie vrouw	peri23-82545	Kies uit de waardelijst de juiste reden waarom u de patiënt postpartum naar de 2 ^e lijn verwezen heeft.
Overig	peri23-82442	Kies "Overig" als de reden om patiënt te verwijzen niet in de waardelijsten voorkomt en vul dit dan als vrije tekst in.
Van 2 ^e naar 3 ^e lijn	peri23-82451	Schrijf in de vrije tekst de reden van overdracht van de 2 ^e naar 3 ^e lijn.
Van 2 ^e naar 1 ^e lijn	peri23-82448	Kies uit de waardelijst de juiste reden van verwijzing. Kiest u Overig dan kunt u dit in de vrije tekst bij "Toelichting reden verwijzing" nog verduidelijken.
Van 3 ^e naar 2 ^e lijn	peri23-82449	Kies uit de waardelijst de juiste reden van verwijzing. Kiest u Overig dan kunt u dit in de vrije tekst bij "Toelichting reden verwijzing" nog verduidelijken.
Toelichting reden verwijzing	Peri23-82016	Hier kunt u reden van de verwijzing nog verduidelijken.
Perinatale periode	peri23-20367	Kies uit de waardelijst de juiste perinatale periode waarin patiënte werd verwezen.

Hoeveelheid bloedverlies tot de acute overdracht	Peri23-20633	Vul hier in (In milliliters) hoeveel bloed patiënte verloor voor u haar verwees.
--	--------------	--

Zorgverlener/ zorginstelling	Peri23-dataelement-1	
Zorgverlener	Peri23-10001	
Zorgverlener UZI nummer	Peri23-10002	U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de zorgverlener wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener AGB-ID	Peri23-10003	U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de zorgverlener wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener LVR1-ID	Peri23-10004	U hoeft hier niets in te vullen. Het LVR1 nummer van de zorgverlener wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener (LVR2, eigen ID)	Peri23-10005	U hoeft hier niets in te vullen. Het LVR2 nummer van de zorgverlener wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Naam zorgverlener	Peri23-10006	Als uw systeem dat niet automatisch doet, vult u hier de naam van de zorgverlener in, meestal uw eigen naam.
Zorgverlenerstype	Peri23-10010	Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener die bedoeld wordt.
Zorgverlenerstype (LVR2-code)	Peri23-10011	Kies uit de waardelijst de juiste zorgverlener die bedoeld wordt.
Telefoon waar zorgverlener is te bereiken	Peri23-10012	Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het normale praktijknummer, maar het (mobiele) nummer waar de verloskundige bereikbaar is voor vragen in verband met de (acute) overdracht. Dit is een essentieel gegeven om in de (urgente) situatie de verwijzer te kunnen bellen voor vragen.
Vrouw	peri23-dataelement-2	

Burgerservicenummer	peri23-10030	Vul hier het Burgerservicenummer van uw patiënt in.
Lokale persoonsidentificatie	peri23-10031	Vul hier het identificatienummer binnen de praktijk in. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het patiënt/kaart nummer voor de 1e lijn of het patiënt/ziekenhuis nummer voor de 2e lijn.
Naamgegevens	peri23-10035	
Voornamen	peri23-10042	Vul hier alle voornamen van de patiënt in .
Initialen	peri23-82359	Vul hier alle voorletters van de patiënt in .
Roepnaam	peri23-82360	Vul hier, in vrije tekst, de naam in waarmee de patiënt gebruikelijk aangesproken wordt.
Achternaam	Peri23-82361	
Soort naam	Peri23-82362	Kies uit de waardelijst de juiste naam die uw cliënte als (eerste) achternaam gebruikt
Voorvoegsel	Peri23-82363	Vul hier eventueel het voorvoegsel van de achternaam in. Let op bij <u>niet</u> Nederlandse namen: el – ait – al – ben – da – de la – del – di – do – dos du- es – la – le en st zijn allemaal voorvoegsels
Achternaam	Peri23-10043	Noteer hier de achternaam de patiënt in die zij bij haar geboorte heeft gekregen.
Geboortedatum	peri23-10040	Vul hier de geboortedatum van uw patiënt in. Indien de dag en/of maand van de geboortedatum niet bekend zijn, vult u dit in als 01-01-xxxx. Wanneer het geboortjaar ook onbekend is, is schatten van het geboortjaar toegestaan.
Adres	peri23-10300	

Straatnaam	peri23-10301	Vul hier de straatnaam van het adres van uw patiënt in. Liever geen postbusnummer!
Huisnummer	peri23-10302	Vul hier het huisnummer van het adres van uw patiënt in. Liever geen huisnummer van een postbusnummer!
Huisletter/huisnummer-toevoeging	peri23-10303	Vul hier de Huisletter/huisnummer-toevoeging van het huisnummer van het adres van uw patiënt in. Liever geen Huisletter/huisnummer-toevoeging van een postbusnummer!
Postcode	peri23-10304	Vul hier de postcode van het adres van uw patiënt in. Liever geen postcode van een postbusnummer!
Plaatsnaam	peri23-10305	Vul hier de plaatsnaam van het adres van uw patiënt in. Liever geen plaatsnaam van een postbusnummer!
Gemeentenaam	peri23-10306	Vul hier, indien mogelijk in uw systeem, de gemeentenaam van het adres van uw patiënt in. Liever geen gemeentenaam van een postbusnummer!
Land	peri23-10307	Vul hier, indien mogelijk in uw systeem, het land van het adres van uw patiënt in. Liever geen land van een postbusnummer!
Adrestype	peri23-10308	Kies uit de waardelijst het juiste adres type
Contactgegevens	peri23-82694	
Telefoonnummers	Peri23-82695	
Telefoonnummer	Peri23-82696	Vul hier het telefoonnummer van uw patiënt in.
TelecomType	Peri23-82697	Kies uit de waardelijst het juiste netwerk of apparaat waar uw patiënt mee belt.
Nummersoort	Peri23-82698	Kies uit de waardelijst of het om een privé- of b.v. een werknummer gaat.

Email adressen	Peri23-82699	
EmailAdres	Peri23-82700	Vul hier het e mail adres van uw patiënt in.
EmailSoort	Peri23-82701	Kies uit de waardelijst of het om een privé- of b.v. een werk e mail adres gaat.
Etniciteit	peri23-10400	Kies uit de waardelijst de juiste etniciteit van uw patiënt, conform het schema zoals dit door de KNOV is opgesteld: https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal	Peri23-10401	Kies uit de waardelijst hoe goed uw patiënte de Nederlandse taal machtig is. Uitgangspunt is dat de voertaal altijd Nederlands is. Hoewel het mogelijk is dat een zwangere en een zorgverlener beiden dezelfde 'vreemde' taal spreken, zal een zwangere te maken krijgen met verschillende zorgverleners die deze taal waarschijnlijk niet machtig zijn. Het vastleggen van de taalvaardigheid in het Nederlands is daarom de beste benadering voor de kwaliteit van de communicatie.
CommunicatieTaal	Peri23-82371	Schrijf in de vrije tekst in welke talen met de patiënt gecommuniceerd kan worden.
Opleidingsniveau	Peri23-82155	Kies uit de waardelijst de juiste hoogst genoten én afgemaakte opleiding
Beroep	Peri23-82154	Schrijf in de vrije tekst welk beroep patiënt (tot voor zeer kort) heeft (gehad)
Accepteert bloedtransfusie	Peri23-82157	Vul hier Ja in als de patiënt een bloedtransfusie en/of bloed gerelateerde producten accepteert Kies anders voor Nee.
Betrokken zorgverlener /zorginstelling	Peri23-80649	

Huisarts	Peri23-82022	
Zorgverlener UZI-nummer	Peri23-82027	U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de huisarts wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener AGB-ID nummer	Peri23-82028	U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de huisarts wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Naam zorgverlener	Peri23-82029	Vul hier in de vrije tekst de naam van de huisarts in
Apotheek	Peri23-82023	
Zorginstelling AGB-ID nummer	Peri23-82028	U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de apotheek wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Naam zorginstelling	Peri23-82031	Vul hier in de vrije tekst de naam van de apotheek in.
Specialist	Peri23-82024	
Zorgverlener UZI-nummer	Peri23-82039	U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de specialist wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener AGB-ID nummer	Peri23-82032	U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de specialist wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Naam zorgverlener	Peri23-82033	Vul hier in de vrije tekst de naam van de specialist in
Type specialist	Peri23-82038	Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener die bedoeld wordt.
Zorginstelling	Peri23-82035	

Zorginstelling AGB-ID	Peri23-82036	U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de zorginstelling wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Naam zorginstelling	Peri23-82037	Vul hier in de vrije tekst de naam van de organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd in.
Anamnese	peri23-80811	
Onder behandeling geweest?	peri23-82020	Vul hier ja in als de vrouw langdurig onder behandeling bij huisarts en/of specialist is (geweest) Wanneer het antwoord op deze vraag 'Nee' is, hoeft 'Algemene anamnese' niet meer door de zorgverlener te worden ingevuld. Hier zijn dan 'geen bijzonderheden'. Aangeraden wordt, alleen items uit de anamnese te registreren die relevant zijn voor de zwangerschap.
Algemene anamnese	peri23-80904	
Auto-immuun aandoening	Peri23-82220	Kies uit de waardelijst de juiste Auto-immuun aandoening die van toepassing is.
Cardiovasculaire aandoening	Peri23-80906	Kies uit de waardelijst de juiste Cardiovasculaire aandoening die van toepassing is.
Urogenitale aandoening	Peri23-82267	Kies uit de waardelijst de juiste Urogenitale aandoening die van toepassing is.
Oncologische aandoening	Peri23-82221	Kies uit de waardelijst de juiste Oncologische aandoening die van toepassing is.
Schildklier aandoening	Peri23-80909	Kies uit de waardelijst de juiste Schildklier aandoening die van toepassing is.
Diabetes mellitus?	Peri23-80910	Vul hier Ja in indien er sprake is van diabetes mellitus (type I of type II) Kies anders voor Nee. Let op: het gaat hier nadrukkelijk <u>niet</u> om zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.
Neurologische aandoening	Peri23-80912	Kies uit de waardelijst de juiste Neurologische aandoening die van toepassing is.

Infectieziekte	peri23-80210	Kies uit de waardelijst de juiste infectieziekte die van toepassing is. Is er sprake van een infectie dan behoeven sommige infecties extra attentiewaarde bij een verwijzing, bijvoorbeeld: MRSA, HIV, Hepatitis.
MDL aandoening	peri23-82219	Kies uit de waardelijst de juiste Maag Darm en Lever aandoening die van toepassing is.
Anemie	peri23-82222	Kies uit de waardelijst de juiste vorm van Anemie die van toepassing is.
Longaandoening	peri23-82266	Kies uit de waardelijst de juiste Longaandoening die van toepassing is.
Gynaecologische aandoening	peri23-80917	Kies uit de waardelijst de juiste gynaecologische aandoening die van toepassing is. Kiest u voor een gynaecologische aandoening dan vermeldt u alléén gynaecologische aandoeningen met mogelijke consequenties voor de zwangerschap en baring
Orthopedische afwijking	peri23-80918	Kies uit de waardelijst de juiste Orthopedische afwijking die van toepassing is.
Bloedtransfusie?	peri23-10805	Vul hier Ja in indien patiënte in het verleden een bloedtransfusie heeft gehad. Kies anders voor Nee.
Transfusiereactie?	peri23-82231	Vul hier Ja in indien patiënte een transfusiereactie heeft gehad Kies anders voor Nee.
Type operatie	peri23-80818	Kies uit de waardelijst de juiste operatie die van toepassing is.
Type stollingsprobleem	peri23-80817	Kies uit de waardelijst het juiste stollingsprobleem dat van toepassing is.
Psychiatrie?	peri23-82159	Vul hier ja in als er sprake is van een psychiatrische aandoening. Kies anders voor Nee. U kiest u alléén "Ja" bij de <u>gediagnosticeerde</u> psychiatrische aandoeningen en u kiest "Nee" bij de psychosociale problemen.
Psychiatrie	peri23-82332	Als er sprake is van een gediagnosticeerde psychiatrische aandoening dan kunt u dit hier verder in de vrije tekst noteren en uitwerken

Overige aandoening?	peri23-82212	Vul hier Ja in als er sprake is van een overige aandoening. Kies anders voor Nee.
Overige aandoening	peri23-80919	Vul hier in de vrije tekst, eventuele andere, niet genoemde afwijkingen of aandoeningen uit de algemene anamnese van de patiënt in.
Toelichting alg. anamnese	peri23-82158	Vul hier, in de vrije tekst, de toelichting in over de gegevens uit de algemene anamnese.
Psychosociale anamnese	peri23-82021	
Psychosociale problematiek?	peri23-80681	Vul hier Ja in indien er sprake is van psychosociale problematiek. Kies anders voor Nee.
Negatieve seksuele ervaringen?	peri23-10803	Vul hier Ja in indien er sprake is van negatieve seksuele ervaringen. Kies anders voor Nee.
Huiselijk geweld?	peri23-80680	Vul hier Ja in indien er sprake is (geweest) van huiselijk geweld. Kies anders voor Nee. Bij huiselijk geweld dat in het verleden heeft plaatsgevonden, maar nu niet meer actueel is, is er voor deze vrouw toch een verhoogd risico aanwezig. Aangeraden wordt ook dan Ja in te vullen. Indien gewenst kan nadere toelichting op deze vraag opgenomen worden in 'Toelichting psychosociale anamnese'
Toelichting psychosociale anamnese.	peri23-82333	Vul hier in de vrije tekst de toelichting over de psychosociale anamnese in.
Relevante allergieën	peri23-10800	Kies uit de waardelijst de juiste relevante allergie die van toepassing is.
Familie anamnese	peri23-80727	
Aandoening	peri23-80728	
Aandoening details	peri23-80729	Schrijf hier in de vrije tekst de details over aandoeningen in de familie anamnese van de patiënt

Type verwantschap	peri23-80730	Kies uit de waardelijst het juiste familielid dat een probleem c.q. aandoening heeft. Om de graad van het verwantschap te bepalen wordt er uitgegaan van de baby.
Indicatie prenatale diagnostiek	peri23-80922	
Indicatie invasieve prenatale diagnostiek?	peri23-80937	Vul hier Ja in indien er sprake is van een Indicatie voor invasieve prenatale diagnostiek. Kies anders voor Nee.
Indicatie GUO?	peri23-80938	Vul hier Ja in indien er sprake is van een Indicatie voor een GUO. Kies anders voor Nee. GUO: Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek
Medicatiegebruik?	peri23-10801	Vul hier Ja in indien er, op dit moment medicatie gebruikt wordt. Kies anders voor Nee.
Medicatiegebruik	peri23-80749	
Soort medicatie	peri23-10802	Vul hier, in de vrije tekst, de merknaam en eventueel de stofnaam van het medicijn dat uw patiënt gebruikt in.
Begindatum	peri23-80751	Vul hier in wanneer is uw patiënt gestart is met het medicijn.
Einddatum	peri23-80752	Vul hier in wanneer is uw patiënt gestopt is met het medicijn.
Dosering medicatie	peri23-80750	Vul hier, in de vrije tekst, de dosering van het medicijn dat uw patiënt gebruikt in.
Bijzonderheden	peri23-80753	Vul hier, in de vrije tekst, eventuele bijzonderheden over de medicijnen en/of het medicijngebruik van uw patiënt in.
Lengte gemeten	peri23-20212	Vul hier in centimeters, de lengte van uw patiënt in.
BMI	peri23-80688	

Datum bepaling	peri23-80689	Vul hier de datum in waarop de BMI bepaald is
BMI vrouw	peri23-10806	U hoeft hier niets in te vullen. De BMI van uw patiënt wordt automatisch door uw systeem berekend.
Vrouwelijke genitale verminking	peri23-80675	Vul hier Ja in, indien er sprake is van vrouwelijke genitale verminking. Kies anders voor Nee.
Type vrouwelijke genitale verminking	peri23-80676	Kies uit de waardelijst het juiste type vrouwelijke genitale verminking waarvan sprake is.
Actuele Bloeddruk	peri23-10807	
Actuele Bloeddruk systolisch	peri23-10808	Noteer hier de laatst gemeten systolische bloeddruk.
Actuele Bloeddruk diastolisch	peri23-10809	Noteer hier de laatst gemeten diastolische bloeddruk.
Bloedgroep vrouw	peri23-10810	Kies uit de waardelijst de juiste bloedgroep van uw patiënt.
Rhesus D factor	peri23-10811	Kies uit de waardelijst de juiste Rhesus D factor van uw patiënt.
Rhesus c factor	peri23-10816	Kies uit de waardelijst de juiste Rhesus c factor van uw patiënt.
Partner	peri23-80633	Let op: U heeft geen behandelrelatie met de partner van de patiënt. Leg dus alléén gegevens vast die strikt noodzakelijk zijn voor de behandeling van de patiënt. Zorg altijd voor onderbouwing van uw besluit gegevens te noteren van anderen dan de patiënt. Omdat een patiënt ook een foetus, pasgeborene of kind kan zijn zal dit steeds verschillen.
Persoonsnaam	peri23-80638	

Voornaam	peri23-80639	Vul hier, in de vrije tekst, de roepnaam (De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.) van de partner van de patiënt in.
Voorvoegsel	peri23-80640	Vul hier, in de vrije tekst, het voorvoegsel (of de voorvoegsels) van de achternaam van de partner van de patiënt in.
Achternaam	peri23-80641	Vul hier, in de vrije tekst, de achternaam(en) van de partner van de patiënt in.
Etniciteit	peri23-80636	Kies uit de waardelijst de etniciteit van de partner uw patiënte in conform het schema zoals dit door de KNOV is opgesteld: https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorafgaande zwangerschap	Peri23dataelement-17	
Identificatie van de zwangerschap	peri23-10590	U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal een uniek identificatienummer voor deze en elke voorafgaande zwangerschap van uw patiënt berekenen.
Wijze einde zwangerschap	peri23-80623	Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop de zwangerschap geëindigd is. TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking na 16 weken. Bij TOP wordt hier 'Partus' geregistreerd, zodat dit meegenomen wordt als pariteit. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16 weken wordt bedoeld. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
Graviditeit	peri23-82001	Vul hier het aantal zwangerschappen Miskramen, EUG's, APLA's, TOP's etc. in, inclusief de huidige zwangerschap
Pariteit	peri23-82002	Vul hier het aantal Partus na 16+0 weken graviditeit in, levend- of dood geboren, in leven of niet meer in leven. Inclusief TOP
Datum einde zwangerschap	peri23-82040	Noteer hier de datum waarop de zwangerschap geëindigd is <u>zonder partus</u> . Dus een Miskraam, EUG's, APLA, etc. in. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het

		embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
Zwangerschapsduur einde zwangerschap	peri23-82041	U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal de zwangerschapsduur automatisch berekenen. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
A terme datum (groep)	peri23-82003	
A terme datum	peri23-82004	Zodra er een à terme datum bekend is kunt u deze (voorlopige) à terme datum hier vastleggen. De definitieve à terme datum wordt elders vastgelegd.
Actuele à terme datum?	peri23-82005	Noteer hier de à terme datum die op dit moment gebruikt wordt. Veelal zal dit de voorlopige à terme datum zijn.
Definitieve à terme datum	peri23-82337	De Definitieve à terme datum is de 'Zekere à terme datum' bepaald volgens het landelijke protocol "Datering Zwangerschap". Indien er geen Zekere à terme datum meer bepaald kan worden op basis van dit protocol is de definitieve à terme datum de à terme datum die voor de rest van de zorgverlening gehanteerd zal worden. Noot: oorzaken van het niet meer kunnen bepalen van Zekere à terme datum volgens het protocol kunnen bijvoorbeeld zijn: miskraam, laat onder controle of geen termijnecho. Voor definitie termijnecho de NVOG / BEN aanhouden.
Diagnose	peri23-82314	
Datum	peri23-82314	Noteer hier de datum van de diagnose
Zwangerschapsduur	peri23-82316	Noteer de zwangerschapsduur ten tijde van de diagnose. N.B. Vaak zal uw systeem dit al voor u doen.
Gynaecologische aandoening	peri23-82317	Kies uit de waardelijst de juiste gynaecologische aandoening met mogelijke consequenties voor de zwangerschap.

Bloedverlies?	peri23-82318	Vul hier Ja in als ergens in de zwangerschap een relevante hoeveelheid bloedverlies heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee
Partiële mola?	peri23-82319	Vul hier Ja in indien er in een zwangerschap sprake was van een partiële mola (dus een mola samen met een intacte zwangerschap) Kies anders voor Nee.
Cervixinsufficiëntie?	peri23-82320	Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap sprake van een cervixinsufficiëntie. Kies anders voor Nee. Kijk voor de definitie van Cervixinsufficiëntie naar de omschrijving hierover binnen uw eigen VSV
Infectie	peri23-82321	Kies uit de waardelijst de juiste infectie die van toepassing is.
Hyperemesis Gravidarum?	peri23-82322	Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap sprake was van hyperemesis gravidarum Kies anders voor Nee. Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van misselijkheid en braken in de zwangerschap die samen gaat met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.
Hypertensieve aandoening	peri23-82323	Kies uit de waardelijst de juiste hypertensieve aandoening die van toepassing was in de zwangerschap.
Zwangerschapscholestase?	peri23-82324	Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap sprake was van zwangerschapscholestase. Kies anders voor Nee. Een zwangerschapscholestase is een aandoening gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met een verhoogde concentratie van random serum galzuren. (NVOG richtlijn 2018)
Diabetes Gravidarum met insuline ?	peri23-82325	Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap sprake was van diabetes gravidarum met insuline gebruik. Kies anders voor Nee.
Afwijkende groei foetus	peri23-82326	Kies uit de waardelijst de juiste afwijkende groei van de foetus die van toepassing was in een zwangerschap.
Dreigende partus immaturus?	peri23-82327	Vul hier Ja in indien uw patiënt in een zwangerschap opgenomen is geweest wegens een dreigende partus immaturus. Kies anders voor Nee. Een partus immaturus is gedefinieerd als er een partus tussen 16w0d tot en met 27w6d.
Dreigende partus prematurus?	peri23-82328	Vul hier Ja in indien uw patiënt in een zwangerschap opgenomen is geweest wegens een dreigende partus prematurus. Kies anders voor Nee. Een partus prematurus is

		gedefinieerd als er een partus tussen 28w0d tot en met 36w6d.
Abruptio placentae?	peri23-82329	Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap sprake was van een abruptio placentae Kies anders voor Nee. Een abruptio placentae is een voortijdige geheel of gedeeltelijke loslating van de placenta.
Irregulaire antistoffen?	peri23-82214	Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap irregulaire antistoffen aanwezig waren. Kies anders voor Nee.
Eerdere bevalling	peri23-dataelement 18	
Diagnose bevalling	peri23-82399	
Datum	peri23-82400	De datum waarop de bevalling heeft plaatsgevonden.
Zwangerschapsduur	peri23-82401	U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal de zwangerschapsduur automatisch berekenen. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
Fluxus postpartum?	peri23-82409	Vul hier Ja in, indien er na de baring sprake was van meer dan 1000 cc bloedverlies binnen 24 uur na de geboorte van het kind. Kies anders voor Nee.
Interventies begin baring (groep)	peri23-80822	
Interventie begin baring	peri23-20560	Kies uit de waardelijst de juiste interventie om de baring te laten starten. LET OP: Het verschil tussen een primaire en een secundaire sectio wordt bepaald door het <u>moment van besluit</u> : Als de patiënt in partu is spreken we van een secundaire sectio. Als de patiënt niet in partu is spreken we van een primaire sectio. Een primaire sectio is dus een geplande sectio maar moet dus ook als zodanig geregistreerd worden als deze <u>uitgevoerd</u> wordt terwijl de weeën zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen. Uw patiënt is "in partu" als zij een dunne verstreken cervix heeft, én tenminste 3 cm.

		ontsluiting, én krachtige pijnlijke weeën om de 2 à 3 minuten.
Indicatie interventie begin baring	peri23-80838	Kies uit de waardelijst de juiste indicatie om de baring op gang te brengen. Let op: Registreer hier één indicatie: de meest zwaarwegende.
Wijze waarop de baring begon	peri23-80708	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de baring begon. Besloten is dat als a-terme de vliezen breken en er zijn geen weeën de baring begonnen is. Als prematuur de vliezen breken zonder weeën is de baring niet begonnen.
Placenta	peri23-80718	
Geboorte placenta	peri23-82336	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de placenta geboren werd.
Hoeveelheid bloedverlies	peri23-10598	Vul hier de (liefst gemeten) hoeveelheid bloedverlies tijdens de baring / het nageboorte tijdperk in. Bloedverlies wordt uitgedrukt in milliliters. Het nageboortetijdperk noemen we de periode tussen de geboorte van het kind en de placenta.
Duur actieve ontsluitingsfase	peri23-10601	Vul hier, afgerond in hele uren in hoe lang de actieve fase van de ontsluiting geduurd heeft. De actieve fase van de ontsluiting gaat over het algemeen in na 3 cm. ontsluiting.
Duur uitdrijving vanaf actief persen	peri23-10206	Vul hier, in minuten in hoelang er geperst werd bij de baring. Sommige systemen kunnen dit ook al voor u berekenen. Let op, bij een meerling noteren we de tijd van de uitdrijving van het eerste kind.
Conditie perineum postpartum.	peri23-80674	Kies uit de waardelijst de juiste staat waarin het perineum de baring postpartum verkeerde.
Vorige uitkomst (per kind)	peri23-19	
Vorige baring	peri23-80709	
Werkelijke plaats baring (type locatie)	peri23-80710	Kies uit de waardelijst de juiste plaats waar de baring heeft plaatsgevonden

Ziekenhuis baring	peri23-82042	
Ziekenhuisnummer (LVR-id)	peri23-82113	U hoeft hier niets in te vullen. Het nummer van het ziekenhuis wordt automatisch door uw systeem ingevuld.
Zorginstelling AGB-ID nummer	Peri23-82043	U hoeft hier niets in te vullen. Het nummer van het ziekenhuis wordt automatisch door uw systeem ingevuld.
Naam zorginstelling	peri23-82044	Als uw systeem dat niet al automatisch doet, vult u hier de naam van het ziekenhuis in waarin de baring heeft plaatsgevonden.
Demografische gegevens	peri23-80696	
Naamgegevens kind	peri23-80701	
Voornamen	peri23-82128	Noteer hier, in de vrije tekst, alle voornamen van het kind.
Initialen	peri23-82355	Noteer hier, in de vrije tekst, alle voorletters van het kind.
Roepnaam	peri23-82352	Noteer hier, in de vrije tekst, de roepnaam (De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.) van het kind.
Achternaam	Peri23-82356	
Soort naam	Peri23-82362	Kies uit de waardelijst welke naam uw patiënt als (eerste) achternaam gebruikt
Voorvoegsel	Peri23-82358	Noteer hier eventueel het voorvoegsel van de achternaam van het/de kind(eren) in. Let op bij <u>niet</u> Nederlandse namen: el – ait – al – ben – da – de la – del – di – do – dos du- es – la – le en st zijn allemaal voorvoegsels.
Achternaam	Peri23-82129	Noteer hier de achternaam(en) van het kind die het bij de geboorte heeft gekregen

Geslacht (medische observatie)	Peri23-80712	Kies uit de waardelijst het juiste geslacht van het kind.
Geboortedatum	peri23-80702	Noteer hier de geboortedatum en tijd van het kind.
Perinatale sterfte	peri23-80704	
Perinatale sterfte?	peri23-40280	Vul hier Ja in, indien de de foetus of het kind is overleden. Kies anders voor Nee.
Fase Perinatale sterfte	peri23-80706	Kies uit de waardelijst de juiste fase waarin de foetus of baby overleden is. We spreken van perinataal gedurende week 22 van de zwangerschap t/m dag 7 postpartum
Kind in leven?	peri23-80989	Hiermee bepalen we de progenituur, dus of het kind of een van de kinderen <u>op dit moment</u> in leven is. Vul hier Ja in, indien van toepassing, kies anders voor Nee. Een levend geboren kind dat 3 jaar na de geboorte overleden is door een ongeluk scoort dus een nee.
Toelichting overlijden kind	peri23-80990	Indien gewenst kunt u, in de vrije tekst, het overlijden van het kind nog nader toelichten.
Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten	peri23-dataelement-21	
Type partus	peri23-80624	Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop de partus geëindigd is. Let op!! Het verschil tussen een primaire en een secundaire sectio wordt bepaald door het <u>moment van besluit</u> : Als de patiënt in partu is spreken we van een secundaire sectio. Als de patiënt niet in partu is spreken we van een primaire sectio. Een primaire sectio is dus een geplande sectio maar moet dus ook als zodanig geregistreerd worden als deze <u>uitgevoerd</u> wordt terwijl de weeën zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen. Uw patiënt is "in partu" als zij een dunne verstreken cervix heeft, én tenminste 3 cm. ontsluiting, én krachtige pijnlijke weeën om de 2 à 3 minuten. TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking na 16 weken. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16 weken wordt bedoeld. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus

		geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
Zwangerschapsduur	peri23-82341	Noteer hier de zwangerschapsduur in bij geboorte van het kind. Bij een meerling per kind vastleggen!
Geboortegewicht	peri23-10604	Noteer hier, in grammen, het geboortegewicht van het kind.
Percentiel van het geboortegewicht	peri23-10605	Kies uit de waardelijst het percentiel dat het best overeenkomt met het geboortegewicht van de baby. Vaak zal uw systeem dit echter al automatisch invullen. Gebruik hiervoor de Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. 2018
Apgar score na 5 min.	peri23-10606	Vul hier de Apgar Score in die de baby destijds na 5 min. heeft gekregen. Let op: Indien er een Apgar Score afgegeven is door de kinderarts die score noteren.
Vaginale kunstverlossing	peri23-10607	Kies uit de waardelijst de juiste vaginale kunstverlossing die bij de partus heeft plaatsgevonden.
Sectio caesarea (group)	peri23-82045	
Beslismoment Sectio caesarea	peri23-82046	Kies uit de waardelijst de juiste fase waarop, in het verleden, een secundaire sectio heeft plaatsgevonden.
Indicatie voor een primaire sectio	peri23-82548	Als bij een van de partus een primaire sectio caesarea heeft plaatsgevonden, kies dan uit de waardelijst de juiste indicatie voor deze primaire sectio caesaria. LET OP: Het verschil tussen een primaire en een secundaire sectio wordt bepaald door het <u>moment van besluit</u> : Als de patiënt in partu is spreken we van een secundaire sectio. Als de patiënt niet in partu is spreken we van een primaire sectio. Een primaire sectio is dus een geplande sectio maar moet dus ook als zodanig geregistreerd worden als deze <u>uitgevoerd</u> wordt terwijl de weeën zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen. Uw patiënt is "in partu" als zij een dunne verstreken cervix heeft, én tenminste 3 cm. ontsluiting, én krachtige pijnlijke weeën om de 2 à 3 minuten.
Indicatie voor een secundaire sectio	peri23-82549	Als bij een van de partus een secundaire sectio caesarea heeft plaatsgevonden, kies dan uit de waardelijst de juiste

		indicatie waarom er besloten werd om deze secundaire sectio caesarea uit te voeren.
Overige interventies	peri23-82215	Kies uit de waardelijst de juiste overige interventies die heeft plaatsgevonden. Het gaat hier om interventies bij de baring náást vaginale kunstverlossing en/of sectio.
Congenitale afwijkingen?	peri23-80997	Vul hier Ja in als (een van) de baby(s) een congenitale afwijking(en) had. Kies anders voor Nee.
Congenitale afwijkingen (groep)	Peri23-80998	
Specificatie congenitale afwijkingen (groep)	peri23-80999	
Specificatie congenitale afwijkingen	peri23-80100	Kies uit de waardelijst de juiste congenitale afwijking die de baby had.
Chromosomale afwijkingen?	peri23-81002	Vul hier Ja in als de baby een chromosomale afwijking had. Kies anders voor Nee.
Specificatie chromosomale afwijking (groep)		
Specificatie chromosomale afwijking	peri23-81004	Kies uit de waardelijst de juiste chromosomale afwijking van de baby.
Bijzonderheden kind	peri23-80717	Hier kunt u, in de vrije tekst, bijzonderheden over het kind noteren.
Zwangerschap	peri23-dataelement-3	
Identificatie van de zwangerschap	peri23-80627	U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal een uniek identificatienummer voor deze en elke voorafgaande zwangerschap van uw patiënt berekenen.
Casemanager naam	peri23-80664	Noteer hier, in de vrije tekst, de naam van de casemanager voor de huidige zwangerschap.

Graviditeit	peri23-20010	Vul hier het aantal zwangerschappen Miskramen, EUG's, APLA's, TOP's etc. in, inclusief de huidige zwangerschap
Pariteit (vóór deze zwangerschap)	peri23-20150	Vul hier het aantal Partus in na 16+0 weken graviditeit in, levend- of dood geboren, in leven of niet meer in leven. Inclusief TOP
Pariteit	peri23-20153	Vul hier het aantal Partus in na 16+0 weken graviditeit in, levend- of dood geboren, in leven of niet meer in leven. Inclusief TOP
Aantal levende kinderen	peri23-80617	Hiermee bepalen we de progenituur, dus of een van de vorige kinderen <u>op dit moment</u> in leven is. Een levend geboren kind dat 3 jaar na de geboorte overleden is door een ongeluk telt dus mee.
Fetal loss	peri23-80678	Noteer hier het aantal voorafgaande foetussen in die voor deze zwangerschap intra uterien en na de 16e week overleden zijn. Dus exclusief TOP. Let op: Een meerling meermaals meetellen!
A terme datum	peri23-20029	
A terme datum	peri23-20030	Zodra er een vermoedelijke à terme datum bekend is kunt u deze datum hier vastleggen. De definitieve à terme datum wordt elders vastgelegd.
Datum bepaling à terme datum	peri23-20040	Noteer hier de datum in waarop de vermoedelijke à terme datum is vastgesteld. De definitieve à terme datum wordt elders vastgelegd.
A terme datum o.b.v.	peri23-20050	Kies uit de waardelijst de juiste methode waarop de vermoedelijke à terme datum is bepaald.
Actuele à terme datum	peri23-20055	Vul hier Ja in, indien de betreffende à terme datum actueel is. Kies anders voor Nee.
Zeker?	peri23-80669	Vul hier Ja in, indien de betreffende à terme datum zeker is. Kies anders voor Nee.
Definitieve à terme datum	peri23-82160	Vul hier de definitieve à terme datum in zodra die is vastgesteld. Bij voorkeur d.m.v. het protocol datering zwangerschap NVOG
Foliumzuur gebruik	peri23-80819	Kies uit de waardelijst het juiste moment waarop met de inname van extra foliumzuur begonnen is.

Hoeveelling	peri23-20020	Noteer hier hoeveel foetussen er in utero zijn (vooral bij een meerling).
Amnioniciteit	peri23-20130	Noteer hier of het gaat om één of meer foetussen in het amnion. Meerdere foetussen in één amnion is monoamniotisch, geen tussenschot zichtbaar).
Chorioniciteit	peri23-20140	Noteer hier of het gaat om één of meer foetussen in het chorion. Meerdere foetussen in één chorion is monochoriaal.
Consanguïniteit?	peri23-80686	Vul hier ja in indien de patiënt en haar partner tot en met de 3e graad familie van elkaar zijn. Kies anders voor Nee
Vals positieve zwangerschap	peri23-20060	Vul hier Ja in indien het gaat om een vals positieve zwangerschap. Kies anders voor Nee. Dus als b.v. de zwangerschapstest zwanger aangaf en achteraf, door de echo, blijkt dat mw. niet zwanger is vult u hier Ja in.
LVR1 administratienummer	peri23-20070	Vul hier het identificatienummer binnen de praktijk of het ziekenhuis in.
Subfertiliteits-behandeling?	peri23-20080	Vul hier ja in indien de zwangerschap met behulp van een fertiliteitsbehandeling (een behandeling om de kans op zwangerschap te vergroten) is ontstaan. Kies anders voor Nee Bij een spontane zwangerschap na een subfertiliteit behandeling kiest u ook voor Ja
Soort Subfertiliteits-behandeling?	peri23-20081	
Ovulatieinductie toegepast?	peri23-20091	Vul hier Ja in als de zwangerschap met behulp van Ovulatie inductie (tabletten, injectie of pomp) gestimuleerd is of op gang is gebracht. Kies anders voor Nee
Geassisteerde conceptie	peri23-20095	Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop deze zwangerschap tot stand is gekomen.
Eiceldonatie toegepast?	peri23-20100	Vul hier ja in indien voor deze zwangerschap eiceldonatie is toegepast. Kies anders voor Nee
Eiceldonatie	peri23-20101	

Geboortedatum eiceldonatrice	peri23-20103	Vul hier, indien bekend, de geboortedatum van de eiceldonatrice in.
Leeftijd eiceldonatrice	peri23-82388	Indien de geboortedatum van de eiceldonatrice niet bekend is kunt u hier haar leeftijd invullen. Als de geboortedatum wel bekend is zal uw systeem dit in veel gevallen voor u doen.
Eicelextractiedatum	peri23-82389	Vul hier, indien bekend, de datum van de extractiedatum van de eicel in.
Cryo embryo?	peri23-82391	Vul hier ja in indien het om een ingevroren embryo gaat. Kies anders voor Nee. Een embryo heeft hartactie en heeft een CRL \geq 10mm.
Embryotransfer Datum	peri23-82390	Vul hier, indien bekend, de transferdatum (datum van terugplaatsing) van het embryo in. Een embryo heeft hartactie en heeft een CRL \geq 10mm.
Trisomie in de anamnese?	peri23-20170	Vul hier Ja in indien er in een van de voorgaande zwangerschappen sprake was van een foetus of kind met een Trisomie. Kies anders voor Nee
Hoogste diastolische tensie	peri23-20220	Vul hier de hoogst gemeten diastolische tensie (onderdruk) gedurende deze zwangerschap in.
Voornemens	peri23-80671	
Risicostatus van de zwangerschap	peri23-82152	Kies uit de waardelijst de juiste risicostatus van de zwangerschap op het moment van de intake of na het MDO.(multidisciplinair overleg)
Voorgenomen plaats baring tijdens de zwangerschap	peri23-20261	Kies uit de waardelijst de plaats waar de patiënt zelf wenst te bevallen. Het gaat hier uitdrukkelijk om de <u>wens van de vrouw</u> voor de bevalling. Soms wordt haar wens beperkt door de risicostatus.
Echelon eindverantwoordelijke	peri23-82153	Kies uit de waardelijst het juiste echelon (de juiste lijn) van degene die verantwoordelijk is vanaf het moment van de intake of na het MDO. (multidisciplinair overleg).
Afspraken	peri23-82011	Schrijf hier in de vrije tekst het zorgplan van deze zwangerschap.

Voorgenomen voeding	peri23-82009	Kies uit de waardelijst welke voeding patiënte van plan is om te gaan geven vanaf het moment van de intake of na het MDO. (multidisciplinair overleg).
Voorgenomen achternaam	peri23-82010	Noteer hier welke achternaam/namen de baby gaat krijgen.
Kraamzorg	peri23-80637	
Kraamzorg aangevraagd	peri23-20270	Vul hier ja in indien de patiënt zich heeft aangemeld voor kraamzorg postpartum. Kies anders voor Nee
Kraamzorginstelling	peri23-80642	Vul hier het de naam van de kraamzorgorganisatie (het kraambureau) in waarbij uw patiënt zich heeft aangemeld.
Bevalplan	peri23-80672	Schrijf hier, in de vrije tekst, het bevalplan van de patiënt. Of voeg de PDF en/of de geschreven tekst van de patiënt hier toe
Prenatale controle	peri23-80732	
Datum controle	peri23-80737	Vul hier de datum in waarop de controle, het (telefoon) gesprek of de mailwisseling heeft plaatsgevonden. N.B. Vaak zal uw systeem dit al voor u neerzetten.
Naam zorgverlener	peri23-80736	Hier kunt u, als het systeem het al niet voor u heeft gedaan, uw eigen naam invullen.
Zorverlener type	peri23-82067	Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener dat u bent.
Zwangerschapduur	peri23-80738	Noteer de zwangerschapsduur in weken en dagen ten tijde van het consult. N.B. Vaak zal uw systeem dit al voor u neerzetten.
Leven voelen	peri23-80746	Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe goed, de patiënt vindt dat de baby beweegt.
Pitting oedeem?	peri23-82583	Vul hier ja in indien er sprake is van pitting oedeem. Kies Fanders voor Nee. We spreken van pitting oedeem als u bijvoorbeeld ter hoogte van het scheenbeen een putje in de huid kunt drukken.

Ernst Oedeem	peri23-80740	Kies uit de waardelijst de juiste waarde voor de ernst van het pitting oedeem.
Rookgedrag	peri23-80810	Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe veel, de patiënt per dag rookt. Als de patiënt minder dan 6 maanden voor de huidige zwangerschap gestopt is met roken vult u <Gestopt met roken vóór huidige zwangerschap> in. Indien zij langer dan 6 maanden voor de huidige zwangerschap gestopt is met roken vult u <Niet gerookt> in.
Alcoholgebruik	peri23-80747	Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe veel, de patiënt per dag drinkt.
Drugsgebruik?	peri23-82102	Vul hier ja in als de patiënt enige vorm van drugs gebruikt. Vul ook Ja in als dit binnen een jaar voor de conceptie is gebruik. Kies anders voor Nee.
Soort drugs	peri23-82103	Kies uit de waardelijst de juiste soort drugs die uw patiënt tot een jaar voor de conceptie of tijdens de zwangerschap heeft gebruikt
Bloeddruk	peri23-80832	
Bloeddruk systolisch	peri23-80833	Noteer hier de systolische bloeddruk.
Bloeddruk diastolisch	peri23-180834	Noteer hier de diastolische bloeddruk.
Gewicht gemeten	peri23-20211	Vul hier het lichaamsgewicht van de patiënt in uitgedrukt in kilogrammen met één cijfer achter de komma bij het eerste bezoek aan uw instelling.
Proteïne in urine o.b.v. strips	peri23-80836	Kies uit de waardelijst de juiste hoeveelheid proteïne in de urine die de strip aangeeft.
Fundushoogte	peri23-80741	Hier kunt u de fundushoogte in centimeters aangeven.
Fundusstand	peri23-80742	Kies uit de waardelijst de juiste fundushoogte volgens de anatomische referentiepunten.

Uitwendig Onderzoek	peri23-80621	
Ligging	peri23-80622	Kies uit de waardelijst de juiste ligging van de foetus.
Indaling	peri23-80744	Kies uit de waardelijst de juiste mate van indaling.
Hartactie aanwezig?	peri23-82104	Vul hier ja in als er foetale hartactie werd waargenomen. Kies hier Nee als er geen foetale hartactie werd waargenomen.
Hartactie	peri23-82105	
Regelmaat hartslag	peri23-82106	Kies uit de waardelijst het juiste ritme van de hartslag van de foetus
Frequentie hartslag	peri23-82107	Kies uit de waardelijst de juiste frequentie van de hartslag van de foetus
Hartslag op basis van	peri23-80745	Kies uit de waardelijst met gebruik van welk apparaat u de hartslag heeft waargenomen.
Actuele aantal levende foetus	peri23-20025	Vul hier in hoeveel foetus(sen) er op dit moment in leven zijn.
Opmerkingen	peri23-80748	Hier kunt u in de vrije tekst eventuele opmerkingen over het uitwendig onderzoek noteren.
Diagnose	peri23-82268	
Datum	peri23-82272	Noteer hier het moment waarop de diagnose gesteld is. Dit wordt meestal automatisch door uw systeem ingevuld.
Zwangerschapsduur	peri23-82285	Noteer de zwangerschapsduur ten tijde van het stellen van de diagnose. Vaak zal uw systeem dit al voor u noteren.

Gynaecologische aandoening	peri23-82269	Kies een aandoening met mogelijke consequenties voor deze zwangerschap uit de waardelijst
Bloedverlies?	peri23-82270	Vul hier Ja in als ergens in deze zwangerschap, dus niet tijdens de partus of in het kraambed, bloedverlies heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee
Partiële mola?	peri23-82286	Vul hier Ja in, indien er sprake is van een partiële mola, met intacte zwangerschap. Kies anders voor Nee.
Cervixinsufficiëntie?	peri23-82271	Vul hier Ja in, indien er sprake is van cervixinsufficiëntie. Kies anders voor Nee. Cervixinsufficiëntie is het te vroeg korter en weker worden van de baarmoederhals waardoor de baby zonder dat er sprake is van weeën voor 36 weken en 6 dagen geboren wordt.
Infectie	peri23-82273	Kies uit de waardelijst de juiste infectie die van toepassing is.
Hyperemesis Gravidarum?	peri23-82274	Vul hier Ja in, indien er sprake is van hyperemesis gravidarum. Kies anders voor Nee. Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van misselijkheid en braken in de zwangerschap die samengaat met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.
Hypertensieve aandoening	peri23-82275	Kies uit de waardelijst de juiste hypertensieve aandoening die van toepassing is.
Zwangerschapscholestase?	peri23-82276	Vul hier Ja in, indien er sprake van is van zwangerschapscholestase. Kies anders voor Nee. Een zwangerschapscholestase is een aandoening gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met een verhoogde concentratie van random serum galzuren. (NVOG richtlijn 2018)
Diabetes Gravidarum met insuline?	peri23-82277	Vul hier Ja in, indien er sprake is van diabetes gravidarum met insuline. Kies anders voor Nee.
Afwijkende groei foetus	peri23-82278	Kies uit de waardelijst de juiste afwijkende groei die van toepassing is.
Dreigende partus immaturus?	peri23-82279	Bij de dreigende partus immaturus hoeft u alleen maar ja of nee in te vullen als er sprake is van een dreiging. Dus als de baby in het geval van een dreigende partus immaturus prematuur of à terme geboren is vult u Ja in. In alle andere gevallen kiest u voor Nee. Een partus immaturus is

		gedefinieerd als er een partus tussen 16w0d tot en met 27w6d.
Dreigende partus prematurus?	peri23-82280	Bij een dreigende partus prematurus hoeft u alleen maar ja of nee in te vullen als er sprake is van een dreiging. Dus als de baby in het geval van een dreigende partus prematurus à terme geboren is vult u Ja in. In alle andere gevallen kiest u voor Nee. Een partus prematurus is gedefinieerd als er een partus tussen 28w0d tot en met 36w6d.
Abruptio placentae?	peri23-82289	Vul hier Ja in, indien voortijdig de placenta geheel of gedeeltelijk is losgelaten. Kies anders voor Nee.
Navelstrengprolaps?	Peri23-82452	Vul hier Ja in, indien er sprake is van een uitgezakte navelstreng. Kies anders voor Nee.
Liggingsafwijking	peri23-82380	Kies uit de waardelijst de juiste liggingsafwijking. Vanaf 36+0 dagen weken is iedere ligging anders dan 'hoofdligging' een afwijkende ligging.
Intra-uteriene vruchtdood	peri23-80613	
Vermoeden intra-uterine vruchtdood?	peri23-82435	Vul hier Ja in, indien er sprake is van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.
Vermoeden IUVD op basis van	peri 23-82526	Kies uit de waardelijst de juiste wijze van vaststelling van het vermoeden van de intra-uteriene vruchtdood.
Interventie	peri23-82377	
Datum	peri23-82378	Vul hier de datum en liefst ook tijd van de interventie in. Meestal zal uw systeem dit echter al voor u doen.
Zwangerschapsduur	peri23-82379	Noteer hier het aantal weken en dagen dat uw patiënt op dit moment zwanger is. Meestal zal uw systeem dit echter al voor u doen.
Interventie	peri23-82376	Kies uit de waardelijst de juiste interventie.

Intra-uteriene behandeling	peri23-82230	Kies uit de waardelijst de juiste intra-uteriene behandeling.
Antenatale betrokkenheid kinderarts?	peri23-82232	Vul hier Ja in, indien er sprake is van antenatale betrokkenheid door de kinderarts. Kies anders voor Nee.
Reden antenatale betrokkenheid kinderarts	peri23-82233	Kies uit de waardelijst de juiste reden(en) voor de antenatale betrokkenheid door de kinderarts. Het kunnen er meer zijn.
Maternale sterfte?	peri23-20670	Vul hier Ja in, indien er sprake is van maternale sterfte tot een jaar na de partus. Kies anders voor Nee.
Datum maternale sterfte	peri23-20680	Vul hier de datum in waarop de maternale sterfte heeft plaatsgevonden.
Wijze einde zwangerschap	peri23-80625	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de zwangerschap geëindigd is. In geval van TOP (Termination of Pregnancy) kiest u voor Partus. TOP zelf wordt elders geregistreerd..U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
APLA nav prenataal onderzoek?	peri23-82369	Vul hier Ja in indien er een APLA heeft plaatsgevonden vanwege een afwijking bij de foetus, Kies anders voor Nee
Datum einde zwangerschap	peri23-20540	Vul hier de datum in van het einde van de zwangerschap indien de zwangerschap niet is geëindigd in een partus. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
Counseling prenatale screening en prenatale diagnostiek	peri23-dataelement-10	
Counseling combinatietest	peri23-82161	
Datum counseling	peri23-20455	Vul hier de datum in waarop de counseling over combinatietest heeft plaatsgevonden.

Zorgverlener	peri23-82410	
Zorgverlener UZI-nummer	Peri23-82411	U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener AGB-ID nummer	Peri23-82412	U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener LVR1-ID nummer	Peri23-82413	U hoeft hier niets in te vullen. Het LVR1 nummer van de counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Naam zorgverlener	Peri23-82415	Als uw systeem dat niet automatisch doet, vult u hier de naam van de counselor in, meestal uw eigen naam.
Direct IPD gewenst?	peri23-20480	Vul hier Ja in indien er een reden is voor directe invasieve prenatale diagnostiek (IPD) en deze ook door de patiënt gewenst is. Kies anders voor Nee
Combinatietest gewenst?	peri23-20485	Vul hier Ja in indien de patiënt een combinatietest wenst. Kies anders voor Nee
Counseling SEO	peri23-82162	
Datum counseling	peri23-82163	Vul hier de datum in waarop de counseling over combinatietest heeft plaatsgevonden.
Zorgverlener	peri23-82410	
Zorgverlener UZI-nummer	Peri23-82420	U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener AGB-ID nummer	Peri23-82421	U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
Zorgverlener LVR1-ID nummer	Peri23-82422	U hoeft hier niets in te vullen. Het LVR1 nummer van de counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Naam zorgverlener	Peri23-82424	Als uw systeem dat niet automatisch doet, vult u hier de naam van de counselor in, meestal uw eigen naam.
Direct GUO gewenst?	peri23-20480	Vul hier Ja in indien er een reden is voor Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) en dit ook door de patiënt gewenst is. Kies anders voor Nee
SEO gewenst?	peri23-20495	Vul hier Ja in indien de patiënt een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wenst. Kies anders voor Nee
Bevalling	peri23-dataelement-6	
Partusnummer	peri23-20500	Vul hier het door u gekozen partus nummer in.
Diagnose bevalling	Peri23-82291	
Datum	peri23-82381	Vul hier de datum van de laatste bevalling in
Zwangerschapsduur	peri23-82382	U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal de zwangerschapsduur automatisch berekenen. U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van een partus het kind geboren is.
PPROM?	peri23-82338	PPROM = Het spontaan breken van vliezen zonder weeën tot een uur na het breken van de vliezen, tussen zwangerschapsduur van 16wk+0d en 36wk+6d. Vul hier Ja in als dit het geval is, kies anders voor Nee
PROM?	peri23-82290	PROM = Het spontaan breken van vliezen zonder weeën tot een uur na het breken van de vliezen, bij een zwangerschapsduur van 37wk+0d of later. Vul hier Ja in als dit het geval is, kies anders voor Nee.
Koorts?	peri23-82292	Vul hier Ja in indien er sprake is van koorts durante partu. We spreken van koorts bij een temperatuur > 38 °C Kies anders voor Nee
Niet vorderende ontsluiting?	peri23-82293	Vul hier Ja in indien er sprake is van een niet vorderende ontsluiting. Kies anders voor Nee Gebruik, voor het vaststellen van een niet vorderende ontsluiting de vigerende richtlijn.

Niet vorderende uitdrijving?	peri23-82294	Vul hier Ja in indien er sprake is van een niet vorderende uitdrijving. Kies anders voor Nee Voor het vaststellen van een niet vorderende uitdrijving wordt verwezen naar de vigerende richtlijn.
Verdenking foetale nood?	peri23-82296	Vul hier ja in indien er tijdens de partus verdenking is op foetale nood. Kies anders voor Nee
Intra-uteriene vruchtdood	peri23-82443	.
Vermoeden intra-uteriene vruchtdood?	peri23-82444	Vul hier Ja in indien er sprake is van een vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.
Vermoeden Intra-uteriene vruchtdood op basis van	peri23-82445	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop het vermoeden op een intra-uteriene vruchtdood is vastgesteld.
Vastzittende placenta?	peri23-82295	Vul hier Ja in indien er sprake is van vastzittende placenta. Kies anders voor Nee. Een placenta zit vast wanneer deze langer dan een uur na de geboorte van het kind nog niet geboren is.
Fluxus postpartum?	peri23-82398	Vul hier Ja in indien er sprake is van een fluxus postpartum. Kies anders voor Nee. Er is sprake van een (ernstige) fluxus postpartum wanneer er binnen 24 uur na geboorte van het kind meer dan 1000 ml bloedverlies is.
Aantal geboren kinderen	peri23-20505	Vul hier het aantal kinderen in dat tijdens deze partus geboren worden.
Risicostatus vóór baring	peri23-20530	Kies uit de waardelijst de juiste risicostatus voor de baring. met voor de baring wordt de periode bedoeld tussen de laatste zwangerschapscontrole en de partus.
Interventies begin baring	peri23-20555	
Datum	peri23-82381	Vul hier de datum en liefst ook tijd van de interventie bij de partus in
Zwangerschapsduur	peri23-82384	Noteer de zwangerschapsduur ten tijde van de interventie. Liefst in weken+dagen. N.B. Vaak zal uw systeem dit al voor u doen.

Interventie begin baring	peri23-20560	Kies uit de waardelijst de juiste interventie om de baring te laten starten. LET OP: Het verschil tussen een primaire en een secundaire sectio wordt bepaald door het <u>moment van besluit</u> : Als de patiënt in partu is spreken we van een secundaire sectio. Als de patiënt niet in partu is spreken we van een primaire sectio. Een primaire sectio is dus een geplande sectio maar moet dus ook als zodanig geregistreerd worden als deze <u>uitgevoerd</u> wordt terwijl de weeën zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen. Uw patiënt is "in partu" als zij een dunne verstreken cervix heeft, én tenminste 3 cm. ontsluiting, én krachtige pijnlijke weeën om de 2 à 3 minuten.
Indicatie interventie begin baring	peri23-20570	Kies uit de waardelijst de juiste indicatie om de baring te laten starten. Let op: Registreer hier één indicatie: de meest zwaarwegende.
Wijze waarop de baring begon	peri23-20550	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de baring naar uw mening begon. Besloten is dat als a-terme de vliezen breken en er zijn geen weeën de baring begonnen is. Als prematuur de vliezen breken zonder weeën is de baring niet begonnen.
Tijdstip begin actieve ontsluiting	peri23-20590	Noteer hier de datum en tijd waarop de actieve ontsluiting begon. Hierbij kunt u gebruik maken van de volgende definitie van actieve ontsluiting: dunne verstreken cervix én ten minste 3 cm ontsluiting én krachtige, pijnlijke weeën om de 2 à 3 minuten.
Duur uitdrijving vanaf actief meepersen	Peri23-82870	Vul hier in hoe lang de uitdrijving heeft geduurd. Meestal zal het systeem dit voor u berekenen. Let op, bij een meerling noteren we de tijd van de uitdrijving van het eerste kind.
Medicatie nageboortetijdperk	peri23-20619	
Medicatie nageboortetijdperk?	peri23-20620	Vul hier Ja in indien er tijdens het nageboortetijdperk medicijnen gegeven zijn. Kies anders voor Nee. Het nageboortetijdperk noemen we de periode tussen de geboorte van het kind en de placenta.
Soort medicatie nageboortetijdperk	peri23-20626	Kies uit de waardelijst het juiste medicijn. Gebruikt u "Overig" Dan kunt u dit nader specificeren met vrije tekst. Het nageboortetijdperk noemen we de periode tussen de geboorte van het kind en de placenta.

Placenta	peri23-80612	
Geboorte Placenta	peri23-20630	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de placenta geboren is.
Natasten?	peri23-82224	Vul hier Ja in indien er sprake is van een vermoeden op een placentarest. Kies anders voor Nee
Placenta compleet	peri23-20631	Kies uit de waardelijst de juiste staat van compleetheid van de placenta.
Datum/tijd geboorte placenta	peri23-80791	Noteer hier de datum en tijd waarop de placenta geboren is.
Placenta naar PA?	peri23-80803	Vul hier Ja in indien de placenta naar de patholoog anatoom gezonden is voor verder onderzoek. Kies anders voor Nee
Uitslag placenta PA	peri23-82392	Hier kunt u in de vrije tekst noteren wat de uitslag van de patholoog anatoom over de placenta was
Bijzonderheden placenta	peri23-80981	Hier kunt u in de vrije tekst noteren of en zo ja welke bijzonderheden er aan de placenta opvielen.
Compleetheid vliezen	peri2380792	Kies uit de waardelijst de juiste staat van de compleetheid van de vliezen.
Hoeveelheid bloedverlies	peri23-20640	Noteer hier de (liefst gemeten) hoeveelheid bloedverlies. Het bloedverlies wordt uitgedrukt in milliliters. Let op: Het bloedverlies tijdens de baring wordt hier meegerekend.
Conditie perineum postpartum.	peri23-80673	Kies uit de waardelijst de juiste vorm van schade aan het perineum postpartum.
Hechten?	peri23-82125	Vul hier Ja in indien het postpartum nodig was om te hechten. Kies anders voor Nee
Wijze van hechten	peri23-80797	Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop gehecht is

Overig trauma?	peri23-82127	Vul hier Ja in indien er postpartum sprake was van andere schade dan aan het perineum. Kies anders voor Nee
Overig trauma	peri23-82126	Kies uit de waardelijst het juiste overig trauma postpartum.
Immunisatie	peri23-80799	
Rhesus D immunisatie?	peri23-80831	Vul hier Ja in indien er postpartum een Rhesus D immunisatie heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee Let op: alléén van toepassing bij Rhesus D negatieve zwangeren.
Datum immunisatie	peri23-80801	Vul hier de datum en liefst ook tijd van de Rhesus D immunisatie postpartum in.
Chargenummer	peri23-82130	Vul hier het Chargenummer (Barcodenummer) van de gegeven ampul Rhesus D immunisatie (Anti D) in
Partusassistentie?	peri23-82131	Vul hier Ja in indien er op enig moment durante partu sprake van partusassistentie is geweest. Kies anders voor Nee
Partusassistentie	peri23-80839	
Partusstadium assistentie gearriveerd	peri23-20650	Kies uit de waardelijst het juiste ogenblik waarop de partusassistentie gearriveerd is.
Rol partusassistent	peri23-82132	Kies uit de waardelijst de juiste rol van de partus assistent
Risicostatus uiteindelijk	peri23-82057	Kies achteraf, uit de waardelijst, de uiteindelijke risicostatus van de partus
Ontslagdatum post partum	peri23-20660	Vul hier in op welke dag en tijd de patiënt naar huis ontslagen is. Let op: Dit geldt alleen voor partus uit de tweede of derde lijn.
Uitkomst (per kind)	peri23-dataelement-7	

Baring	peri23-40002	
Werkelijke plaats baring	peri23-40003	Kies uit de waardelijst de juiste plaats waar de baring heeft plaatsgevonden. Een geboortecentrum is een centrum met een droge verbinding met een ziekenhuis. Bevallingen in een kraamhotel zonder verbinding met een ziekenhuis worden gezien als thuisbevalling. De reden hiervoor is dat een geboortecentrum poliklinisch is en een kraamhotel een verplaatste thuisbevalling. Een kraamhotel of een kamer in een verloscentrum is puur alleen een andere plek om te bevallen.
Ziekenhuis baring	peri23-82114	
Ziekenhuisnummer (LVR id)	peri23-40005	Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden vermeld u hier het LVR nummer van het ziekenhuis. N.B. De meeste systemen zullen dit automatisch voor u invullen
Zorginstelling AGB-ID nummer	Peri23-82116	U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van het ziekenhuis wordt automatisch door uw systeem ingevuld.
Naam zorginstelling	peri23-82117	Als uw systeem dat niet al automatisch doet, vult u hier de naam van het ziekenhuis in waarin de baring heeft plaatsgevonden.
Demografische gegevens	peri23-40006	
Identificaties Kind	peri23-40007	
BSN Kind	peri23-40010	Vul hier het BSN nummer van het kind in. Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer wordt toegekend wanneer iemand ingeschreven wordt bij de Basisregistratie personen (BRP).
Lokale identificatie kind	peri23-40011	Hier kunt u, zolang er nog geen BSN bekend is, zelf een eigen identificatie aan de baby geven
Identificatie kind PRN formaat	peri23-40015	Ten behoeve van Perined zal uw systeem hier zelf een identificatie van de baby genereren

Naamgegevens kind	peri23-82051	
Voornamen	peri23-82353	Vul hier alle voornamen van het/de kind(eren) in .
Initialen	peri23-82354	Vul hier alle voorletters van het/de kind(eren) in .
Roepnaam	peri23-82052	Vul hier de roepnaam van het/de kind(eren) in .
Achternaam	Peri23-82053	
Voorvoegsel	Peri23-82054	Vul hier eventueel het voorvoegsel van de achternaam van het/de kind(eren) in. Let op bij <u>niet</u> Nederlandse namen: el – ait – al – ben – da – de la – del – di – do – dos du- es – la – le- st - o' – mc zijn allemaal voorvoegsels
Achternaam	Peri23-82055	Vul hier de achternaam van het/de kind(eren) in die het/zij bij de geboorte heeft/hebben gekregen
Contactgegevens	peri23-82364	
Telefoonnummers	peri23-82365	
Soort telefoonnummer	Peri23-82366	Kies uit de waardelijst of het bijvoorbeeld om een privé- of een werknummer gaat.
Telefoonnummer	peri23-82367	Vul hier de telefoonnummers van uw patiënt én haar eventuele partner in.
Adres t.b.v. de hielprik	peri23-40032	
Straatnaam	peri23-82133	Vul hier de straatnaam van het verblijfadres van de baby in.

Huisnummer	peri23-82134	Vul hier het huisnummer van het verblijfadres van de baby in.
Huisletter/huisnummer-toevoeging	peri23-82135	Vul hier de Huisletter/huisnummer-toevoeging van het huisnummer van het verblijfadres van de baby in.
Postcode	peri23-82136	Vul hier de postcode van het verblijfadres van de baby in.
Plaatsnaam	peri23-82137	Vul hier de plaatsnaam van het verblijfadres van de baby in.
Land	peri23-182138	Vul hier het land van van het verblijfadres van de baby in.
Adrestype	peri23-82139	Kies uit de waardelijst het juiste adres type van het verblijfadres van de baby.
Adres	peri23-40033	
Postcode	peri23-40034	Vul hier de postcode van het tijdelijke verblijfadres of vaste woonadres van het kind in.
Geslacht (administratief)	peri23-40040	Kies uit de waardelijst, indien bekend, het juiste geslacht van de baby. Kies anders voor Onbepaald of onbekend.
Geslacht (medische observatie)	peri23-40041	Kies uit de waardelijst het geslacht van het kind dat het meest met uw waarnemingen overeenkomt
Geboortedatum	peri23-40050	Noteer hier de geboortedatum en tijd van het kind.
Geboorteplaats	peri23-40004	
Postcode	peri23-80629	Vul hier de postcode van de geboorteplaats van het kind in. Indien mogelijk doet uw systeem dit al voor u.

Plaatsnaam	peri23-80630	Vul hier de plaatsnaam van de geboorteplaats van het kind in. Indien mogelijk doet uw systeem dit al voor u.
Gemeentenaam	peri23-80631	Vul hier de gemeentenaam van de geboorteplaats van het kind in. Indien mogelijk doet uw systeem dit al voor u.
Land	peri23-80632	Vul hier het land van uw de geboorteplaats van het kind in. Indien mogelijk doet uw systeem dit al voor u.
Meerlingindicatie?	peri23-82087	Kies Ja indien de baby een van een meerling is. Kies anders voor Nee
Rangnummer kind	peri23-40025	Vul hier (bij een meerling) het volgnummer van het kind in waarbij de eerstgeborene nummer 1 krijgt, de tweede nummer 2 enz.
Perinatale sterfte	peri23-40279	
Perinatale sterfte?	peri23-40280	Vul hier Ja in indien de foetus of het kind is overleden tussen 22 weken en 0 dagen in de zwangerschap en voor 7 dagen na de bevalling. Kies anders voor Nee
Fase Perinatale sterfte	peri23-40290	Kies uit de waardelijst de juiste fase waarin de foetus of baby is overleden.
Datum en tijd vaststelling perinatale sterfte	peri23-40300	Vul hier de datum en liefst ook de tijd in waarop vastgesteld is dat het kind is overleden. Dit hoeft dus niet de werkelijke datum en tijd te zijn waarop de baby is overleden.
Foetus identificatie (zoals ante partum gehanteerd)	peri23-40027	Vul hier (bij een meerling) het volgnummer van het kind in waarbij de eerstgeborene nummer 1 krijgt, de tweede nummer 2 enz. Cijfers worden gebruikt om aan te geven welk kind als eerste geboren wordt.
Foetus volgletter (zoals ante partum gehanteerd)	peri23-40028	Kies hier uit de waardelijst de juiste volgletter van de geboren babys, waarbij de eerstgeborene de letter A krijgt, de tweede B enz. Letters worden veelal bij de echoscopie gebruikt
Kindspecifieke maternale gegevens	peri23-71	
Bijstimulatie toegediend?	peri23-20616	Vul hier Ja in indien er tijdens de ontsluitingsperiode bijstimulatie is gegeven. Let op, het gaat hier <i>niet</i> om chemische inleiding. Het gaat hier om bijstimulatie vanwege

		weënzwakte en/of stagnerende baring en/of langdurig gebroken vliezen à terme. Bij gebroken vliezen à terme is de baring immers begonnen. Kies anders voor Nee
Amniotomie	peri23-20579	
Amniotomie?	peri23-20580	Vul hier Ja in als de vliezen artificieel gebroken zijn. Kies anders voor Nee
Fase Amniotomie	peri23-20585	Kies uit de waardelijst de juiste fase waarin de amniotomie is uitgevoerd
Tijdstip breken vliezen	peri23-80619	Vul hier een datum en liefst ook een tijd in waarop de vliezen zijn gebroken als er tenminste geen sprake is van een hoge vliesscheur.
Kleur en consistentie vruchtwater	peri23-20610	Kies uit de waardelijst de juiste aard van het vruchtwater.
Tijdstip actief meepersen	peri23-30030	Vul hier de datum en ook tijd in waarop met persen gestart is
Episiotomie?	peri23-30050	Vul hier Ja in indien er sprake is van een episiotomie. Kies anders Nee.
Indicatie episiotomie	peri23-80794	Kies uit de waardelijst de juiste indicatie voor de episiotomie.
Locatie episiotomie	peri23-30055	Kies uit de waardelijst de juiste locatie van de episiotomie.
Pijnbestrijding?	peri23-82090	Vul hier Ja in als er sprake is van pijnbestrijding. Kies anders Nee.
Pijnbestrijding	peri23-82091	
Datum/tijd	peri23-82394	Vul hier de datum en ook tijd in van het starten van de pijnbestrijding.

Methode	peri23-82093	
Methode	peri23-82092	Kies uit de waardelijst de juiste methode van pijnbestrijding die is gebruikt.
Overig middel	peri23-82094	
Middel	peri23-82095	Kies uit de waardelijst het juiste overige pijnbestrijdingsmiddel dat is gebruikt.
Toediening	peri23-82096	Kies uit de waardelijst de juiste vorm van toediening van het overige pijnbestrijdingsmiddel dat is gebruikt. Let op: TENS = Elektroden, Entonox = Inhalatie, Morfinomimetica = Intraveneus PCA óf Intraveneus óf Intramusculair, Waterinjectie = Intra- of subcutaan.
Periode	peri23-82097	Kies uit de waardelijst de juiste periode van de bevalling waarin de pijnstilling is gegeven
Reden	peri23-82098	Kies uit de waardelijst de juiste reden voor de pijnstilling
Sedatie?	peri23-80827	Vul hier Ja in als er sprake is van Sedatie Kies anders voor Nee. Let op: Sedatie is geen pijnbestrijding en wordt in principe niet durante partu toegepast. Onder sedatie valt bijvoorbeeld dormicum, phenergan. Opiaten, epiduraal of spinaal horen onder pijnbestrijding en dus niet onder sedatie.
Sedatie	peri23-82099	
Datum/tijd	peri23-82395	Vul hier de datum en liefst ook de tijd in waarop de sedatie gestart is.
Reden	peri23-82101	Kies uit de waardelijst de juiste reden voor de sedatie
Kindspecifieke uitkomstgegevens	peri23-dataelement-72	

Type partus	peri23-80626	Kies uit de waardelijst het juiste type bevalling. Let op: Het verschil tussen een primaire en een secundaire sectio wordt bepaald door het <u>moment van besluit</u> : Als de patiënt in partu is spreken we van een secundaire sectio. Als de patiënt niet in partu is spreken we van een primaire sectio. Een primaire sectio is dus een geplande sectio maar moet dus ook als zodanig geregistreerd worden als deze <u>uitgevoerd</u> wordt terwijl de weeën zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen. Uw patiënt is "in partu" als zij een dunne verstreken cervix heeft, én tenminste 3 cm. ontsluiting, én krachtige pijnlijke weeën om de 2 à 3 minuten. TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking na 16 weken.
TOP nav prenataal onderzoek?	peri23-82397	Vul hier Ja in als er sprake is van een TOP nav prenataal onderzoek. (Ongewenste uitkomst) Kies anders voor Nee
Zwangerschapsduur	peri23-20062	Vul hier in weken en dagen de zwangerschapsduur in bij de geboorte van het kind. Bij een meerling per kind vastleggen!
Ligging bij geboorte	peri23-40140	Kies uit de waardelijst de juiste ligging van het kind bij de geboorte
Aanpakker kind	peri23-40149	
Naam zorgverlener	peri23-82058	Vul hier de naam van de zorgverlener in die het kind heeft aangepakt. Dat kan iemand anders zijn dan de supervisor of verantwoordelijke
Rol aanpakker kind	peri23-40150	Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener die het kind heeft aangepakt.
Identificatie aanpakker	peri23-40160	Vul hier het UZI, AGB, LVR of BIG nummer van de aanpakker van het kind in. Uw systeem zal hier in veel gevallen automatisch een identificatienummer noteren.
Supervisor	peri23-40169	
Naam zorgverlener	peri23-82059	Vul hier de naam van de zorgverlener in die de supervisor was bij de partus. Een supervisor ziet toe de baring. Een supervisor kan iemand anders zijn dan de aanpakker of verantwoordelijke.

Rol Supervisor	peri23-40170	Kies uit de waardelijst het juiste type supervisor bij de partus. Een supervisor ziet toe de baring een eindverantwoordelijke hoeft er niet bij te zijn.
Identificatie supervisor	peri23-40180	Vul hier het UZI, AGB, LVR of BIG nummer van de supervisor van de partus in. Uw systeem zal hier in veel gevallen automatisch een identificatienummer noteren.
Vaginale kunstverlossing	peri23-40189	
Vaginale kunstverlossing	peri23-40190	Als bij type partus vaginale kunstverlossing is ingevuld, kies dan uit de waardelijst de verrichte vaginale kunstverlossing .
Succes vaginale kunstverlossing?	peri23-40200	Vul hier Ja in als het kind met een vaginale kunstverlossing geboren wordt. (Onafhankelijk van de conditie van het kind.) Kies anders voor Nee.
Indicatie vaginale kunstverlossing	peri23-40210	Kies uit de waardelijst de juiste indicatie voor de vaginale kunstverlossing.
Sectio caesarea	peri23-40219	
Beslismoment Sectio caesarea	peri23-40225	Als bij type partus Sectio secundair is ingevuld, kies dan uit de waardelijst het juiste tijdstip waarop er besloten werd om de sectio caesarea uit te voeren.
Indicatie voor een primaire sectio	peri23-82546	Kies uit de waardelijst de juiste reden waarom voor een primaire (geplande) sectio is gekozen.
Indicatie voor een secundaire sectio	peri23-82547	Kies uit de waardelijst de juiste reden waarom voor een secundaire sectio is gekozen.
Overige interventies	peri23-40240	Kies uit de waardelijst de juiste overige interventies als die hebben plaatsgevonden. Dit gaat om de interventies bij baring (eventueel) náást vaginale kunstverlossing en/of sectio.
Lichamelijk onderzoek kind	peri23-80766	
Apgarscore na 1 min.	peri23-40070	Vul hier de Apgarscore in die het kind 1 min. na de geboorte heeft gekregen. Let op: Indien er een AS afgegeven is door de kinderarts die score noteren.

Apgarscore na 5 min.	peri23-40071	Vul hier de Apgarscore in die het kind 5 min. na de geboorte heeft gekregen. Let op: Let op: Indien er een AS afgegeven is door de kinderarts die score noteren.
Apgarscore na 10 min.	peri23-40071	Vul hier de Apgarscore in die het kind 10 min. na de geboorte heeft gekregen. Let op: Let op: Indien er een AS afgegeven is door de kinderarts die score noteren.
Afwijkende bevindingen kind?	peri23-82206	Vul hier Ja in indien er na uitvoeren van het lichamelijk onderzoek van het kind (volgens protocol) afwijkende bevindingen geconstateerd zijn. Kies anders voor Nee
Afwijkende bevindingen	peri23-82207	
Algemene indruk	peri23-82168	
Zieke indruk?	peri23-82169	Vul hier Ja in indien het kind een zieke indruk maakt. Kies anders voor Nee.
Bewustzijn	peri23-82170	Kies uit de waardelijst de geconstateerde mate van bewustzijn van het kind.
Respiratie	peri23-82171	Kies uit de waardelijst de geconstateerde manier van ademen van het kind.
Dysmorphie	peri23-82173	Kies uit de waardelijst de geconstateerde vorm van de afwijking van het kind.
Bijzonderheden huid	peri23-80769	Kies uit de waardelijst de geobserveerde bevindingen aan de huid van het kind van het kind.
Hoofd	peri23-80770	
Fontanel	peri23-80768	Kies uit de waardelijst het geconstateerde niveau van de grote fontanel van het kind.
Schedel	peri23-80771	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan de schedel van het kind en de huid er omheen.

Ogen	peri23-80772	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan de ogen en de oogleden van het kind.
Oren	peri23-80773	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan de oren van het kind
Neus	peri23-80774	Beschrijf hier, in de vrije tekst, de eventuele afwijkende bevindingen aan de neus van het kind
Mond	peri23-80775	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan de mond en de omliggende weefsels zoals lippen, verhemelte of kaak van het kind.
Kin-standafwijking?	peri23-80776	Vul hier Ja in indien er sprake is van een afwijkende stand van de kin van het kind. Kies anders voor Nee.
Bijzonderheden hals	peri23-80777	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan de hals van het kind
Thorax	peri23-80778	
Inspectie	peri23-80784	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen van de borstkas van het kind.
Skelet	peri23-82176	
Claviculae fractuur	peri23-82177	Kies uit de waardelijst de geconstateerde zijde(n) waar het sleutelbeen van het kind gebroken is.
Overige afwijkingen ribben/sternum.	peri23-82178	Beschrijf hier, in de vrije tekst, eventuele afwijkende bevindingen aan de ribben en het borstbeen van het kind.
Mamma	peri23-82179	Kies uit de waardelijst de geconstateerde kant(en) waar de mamma verdikt is.
Hart	peri23-80786	Kies uit de waardelijst de geconstateerde hartafwijking van het kind.

Longen	peri23-82180	Kies uit de waardelijst de geconstateerde ademhalingsproblemen van het kind.
Abdomen	peri23-80779	
Inspectie	peri23-82181	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding van de buik van het kind.
Buikwand	peri23-82182	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding aan de buikwand van het kind.
Lever-vergroot?	peri23-82183	Vul hier ja in als u d.m.v. uitwendig onderzoek de lever van het kind kunt voelen. Kies anders voor Nee
Milt palpabel?	peri23-82184	Vul hier ja in als u d.m.v. uitwendig onderzoek de milt van het kind kunt voelen. Kies anders voor Nee
Darmen afwijkende peristaltiek?	peri23-82225	Vul hier ja in als er sprake is van afwijkende peristaltiek van de darmen van het kind. Kies anders voor Nee.
Toelichting darmen afwijkende peristaltiek	peri23-82185	Beschrijf hier, in de vrije tekst, eventuele afwijkende bevindingen aan de peristaltiek van de darmen van het kind.
Anus atresie/fistel?	peri23-82186	Vul hier ja in als er sprake is van een Anus atresie en/ of fistel bij het kind. Kies anders voor Nee. In de volgende versie zullen deze twee items uit elkaar gehaald worden.
Andere palpabele weerstanden?	peri23-82187	Vul hier Ja in als u andere weerstanden in de buik van het kind kunt voelen dan die van de lever en/of de milt. Kies anders voor nee
Toelichting palpabele weerstanden.	peri23-82188	Beschrijf hier, in de vrije tekst, eventuele palpabele weerstanden in de buik van het kind.
Rug	peri23-80780	
Inspectie / palpatie	peri23-82189	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding van de rug van het kind.

Overige bevindingen	peri23-82190	Beschrijf hier, in de vrije tekst, eventuele overige geconstateerde bevindingen aan de rug van het kind.
Extremiteten	peri23-80781	
Proportie afwijkend?	peri23-82191	Vul hier Ja in als de armen en/of benen van het kind een afwijkende verhouding hebben ten opzichte van het lichaam. Kies anders voor Nee
Vorm afwijkend?	peri23-82192	Vul hier Ja in als de armen en/of benen van het kind een afwijkende vorm hebben of ontbreken. Kies anders voor Nee
Toelichting afwijkende vorm	peri23-82226	Beschrijf hier, in de vrije tekst, de geconstateerde vorm of het ontbreken van, de armen of benen van het kind.
Heupen asymmetrisch asymmetrische plooiën?	peri23-82193	Vul hier Ja in als de heupen van het kind asymmetrisch zijn of de billen asymmetrische plooiën bevatten. Kies anders voor Nee
Beweeglijkheid	peri23-82194	Kies uit de waardelijst de juiste mate van beweeglijkheid van de extremiteiten van het kind.
Handen	peri23-82195	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding aan de handen van het kind.
Voeten	peri23-82196	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding aan de voeten van het kind.
Genitalia	peri23-80782	
Mannelijk	peri23-82197	
Penis	peri23-82198	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding aan het mannelijk geslachtsorgaan van het kind
Vrouwelijk	peri23-82198	Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding aan het vrouwelijk geslachtsorgaan van het kind

Geslacht niet conclusief	peri23-82200	Beschrijf hier, in de vrije tekst, de afwijkende vorm of de bijzonderheden van het geslachtsorgaan van het kind.
Neurologie	peri23-82201	
Tonus	peri23-82202	Kies uit de waardelijst de geconstateerde tonus van het kind
Beweeglijkheid-asymmetrisch?	peri23-82203	Vul hier Ja in indien de beweeglijkheid van het kind asymmetrisch is. Kies anders voor Nee
Refelexen - Moro-asymmetrisch?	peri23-82204	Kies uit de waardelijst de juiste reflexen van het kind
Geboortegewicht	peri23-40060	Vul hier, in grammen, het geboortegewicht van het kind in, zo kort mogelijk na de geboorte gemeten.
Percentiel van het geboortegewicht	peri23-80670	Kies uit de lijst het percentiel dat het best overeenkomt met het geboortegewicht van de baby. Vaak zal uw systeem dit echter al automatisch invullen. Gebruik hiervoor de Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven. 2018
Lengte	peri23-80759	Vul hier, in centimeters, de lengte van het kind in kort na de geboorte, tenminste als er een medische reden is om dit te meten, b.v. bij verdenking op geringe lengte.
Schedelomtrek	peri23-80760	Vul hier, in centimeters de schedelomtrek van het kind in, zo kort mogelijk na de geboorte.
Indaling Testes	peri23-82385	Kies uit de waardelijst de juiste indaling van beide testes.
Bijzonderheden lichamenlijk onderzoek kind	peri23-80788	Beschrijf hier, in de vrije tekst, de andere bijzonderheden van het lichamenlijk onderzoek bij het kind.
Congenitale afwijkingen?	peri23-40080	Vul hier Ja in indien het kind aangeboren lichamenlijke afwijkingen lijkt te hebben. Kies anders voor Nee.
Congenitale afwijkingen (groep)	peri23-dataelement-40081	

Specificatie Congenitale afwijkingen (groep)	peri23- 40082	
chromosomale afwijkingen?	peri23-40110	Vul ja in als er sprake is van aangeboren lichamelijke aandoeningen die passen bij chromosomale afwijkingen. Kies anders voor Nee
Specificatie chromosomale afwijkingen (groep)	peri23- 40111	
Specificatie Congenitale afwijkingen	peri23-40090	Kies uit de waardelijst de juiste aangeboren afwijking.
Waarschijnlijkheid congenitale afwijking	peri23-40100	Kies uit de waardelijst of de aangeboren afwijking zeker is (door tenminste een kinderarts vastgesteld) of dat het nog een vermoeden is.
Chromosomale afwijkingen	peri23-40110	Vul hier ja in als de aangeboren afwijkingen passen bij een chromosomaal probleem. Kies anders voor Nee
Specificatie chromosomale afwijking	peri23-40111	
Specificatie chromosomale afwijking	peri23-40120	Kies uit de waardelijst de juiste chromosomale afwijking.
Waarschijnlijkheid chromosomale afwijking	peri23-40130	Kies uit de waardelijst of de chromosomale afwijking zeker is (door tenminste een kinderarts vastgesteld) of dat het nog een vermoeden is.
Problematiek kind?	peri23-82334	Vul hier Ja in als er sprake is van een probleem bij het kind. Kies anders voor Nee.
Problematiek kind	peri23-80789	Kies uit de waardelijst het juiste probleem dat het kind heeft. Deze lijst is gedetailleerd zodat een rapportage vanuit de kinderarts gestructureerd opgeslagen kan worden in het verloskundig dossier.
Navelstreng vaten	peri23-80793	Kies uit de waardelijst het juiste aantal vaten in de navelstreng van het kind
Vitamine K	peri23-80761	Vul hier Ja in als het kind binnen 24 uur na de geboorte 1 mg vitamine K heeft gehad. Kies anders voor Nee.

Hepatitis B	peri23-82369	
Hepatitis B immunisatie?	peri23-82368	Vul hier Ja in als het kind binnen 2 uur na de geboorte de Hepatitis B immunisatie gekregen heeft. Kies anders voor Nee
Hepatitis B vaccinatie?	peri23-82370	Vul hier Ja in als het kind binnen 48 uur na de eerste geboorte de Hepatitis B vaccinatie gekregen heeft. Kies anders voor Nee
Kinderarts Betrokken?	peri23-82119	Vul hier Ja in als de kinderarts na de bevalling betrokken is geweest bij de baby. Kies anders voor Nee.
Betrokkenheid kinderarts	peri23-82120	
Datum betrokkenheid	peri23-82122	Vul hier de datum en zo mogelijk ook de tijd in waarop de kinderarts of neonatoloog bij de baby betrokken is geweest.
Reden betrokkenheid	peri23-82123	Kies uit de waardelijst de juiste reden waarom de kinderarts bij de zorg rond de baby betrokken is geweest
Type betrokkenheid	peri23-82121	Kies uit de waardelijst het juiste type betrokkenheid van de kinderarts, dus of het gaat om een consult of een overdracht naar de kinderarts
Zorginstelling LVR-ID	Peri23-82335	Hier hoeft u niets in te vullen. Het Perined identificatienummer van de zorginstelling van de kinderarts wordt automatisch door uw systeem ingevuld.
Bijzonderheden kind	peri23-80790	Beschrijf hier, in de vrije tekst, de andere bijzonderheden van het kind in de eerste week postpartum die u nog niet heeft kunnen vastleggen.
Opmerkingen baring	peri23-80980	Beschrijf hier, in de vrije tekst, de andere bijzonderheden van de baring die u nog niet heeft kunnen vastleggen.
(HL7: labaanvraag)	peri23-23060	
Uitvoerend lab	peri23-23070	Noteer hier, in de vrije tekst, in welk laboratorium het van het kind afgenomen bloed verwerkt is.

Medisch onderzoek	peri23-data element-14	
Maternale onderzoeksgegevens	peri23-142	
Urine-, bloed- en aanvullende onderzoeken	peri23-80959	
PSIE	peri23-80949	
Irregulaire antistoffen?	peri23-10812	Vul hier Ja in, indien er irregulaire antistoffen aanwezig zijn in het bloed van de patiënt. kies anders voor Nee.
Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig	peri23-10813	Kies uit de waardelijst de juiste antistoffen in het bloed van de patiënt. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk
Postnatale fase	peri23-dataelement-16	
Diagnose interventie post partum	peri23-82297	
Datum	peri23-82298	Vul hier de datum en zo mogelijk ook de tijd in waarop de interventie heeft plaatsgevonden
Pathologie vrouw	peri23-82209	Kies uit de waardelijst het juiste probleem dat aanleiding was voor de interventie. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Interventie	peri23-82373	Kies uit de waardelijst de juiste interventie die heeft plaatsgevonden. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Kraamzorg?	Peri23-80843	Vul hier Ja in als de patiënt is ingeschreven bij een kraamzorgorganisatie.
Kraamzorginstelling	peri23-82083	

Naam zorginstelling	peri23-82084	Hier kunt u, in vrije tekst, de naam van de kraamzorgorganisatie van uw patiënt invullen.
Telefoonnummer instelling	peri23-82085	Hier kunt u het telefoonnummer van de kraamzorgorganisatie van uw patiënt invullen
Bloedverlies kraambed	peri23-82124	Kies uit de waardelijst de juiste hoeveelheid bloedverlies tijdens de kraamvisites.
Opmerkingen kraambed	peri23-80982	Hier kunt u, in de vrije tekst, uw opmerkingen over het kraambed noteren.
Kindspecifieke gegevens	peri23-dataelement - 161	
Rangnummer kind	peri23-83377	Noteer hier, bij een meerling, om welk kind het gaat. Kind 1, 2 of drie etc.) Het rangnummer wordt gegeven indezelfde bepaald door de volgorde waarin de kinderen geboren worden
Voeding kind	peri23-70009	
Voeding kind (datum)	peri23-70011	Vul hier de datum in waarop de soort voeding betrekking heeft.
Substantie voeding	peri23-70030	Kies uit de waardelijst het juiste soort voeding van de neonat.
Betrokkenheid andere zorgverlener?	peri23-82118	Vul hier ja in als er een andere zorgverlener dan uzelf bij de zorg voor de baby betrokken is (geweest). Kies anders voor Nee
Betrokkenheid andere zorgverlener	peri23-40249	
Type betrokkenheid	peri23-40250	Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de andere zorgverlener bij de neonat betrokken is (geweest).
Datum betrokkenheid	peri23-40260	Hier kunt u de datum noteren waarop de zorg van de andere zorgverlener betrokken is (geweest).

Zorgverlener type	peri23-40261	Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener die bij de zorg betrokken is geweest.
Reden betrokkenheid	peri23-80765	Kies uit de waardelijst de juiste reden voor de betrokkenheid van de andere zorgverlener bij de neonaat
Nacontrole	peri23-80844	
Datum controle	peri23-80846	Hier kunt u de datum invullen waarop de nacontrole heeft plaatsgevonden. De nacontrole vindt doorgaans 6 weken postpartum plaats.
Naam zorgverlener	peri23-80847	Hier kunt u, in vrije tekst, de naam van de zorgverlener invullen die de nacontrole heeft uitgevoerd. Meestal zal het systeem dit voor u doen.
Zorgverlener type	peri23-82086	Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener die de nacontrole heeft uitgevoerd.
Kindspecifieke kraamperiodegegevens	peri23-80848	
Substantie voeding kind	peri23-80851	Kies uit de waardelijst het juiste type voeding van de neonaat bij de nacontrole
Bijzonderheden kind kraamperiode.	peri23-80865	Hier kunt u, in de vrije tekst, de bijzonderheden van de neonaat in de kraamperiode beschrijven.
Anticonceptie besproken?	peri23-80983	Vul hier ja in als u tijdens de nacontrole met uw patiënt over anticonceptie heeft gesproken. Kies anders voor Nee
Type anticonceptie	peri23-80856	Kies uit de waardelijst de juiste vorm van anticonceptie die uw patiënt postpartum wil gaan gebruiken of al gebruikt.
Vloeien	peri23-80857	Kies uit de waardelijst de juiste mate van bloedverlies 6 weken postpartum.
menstruatie?	peri23-80858	Vul hier ja in als uw patiënt 6 weken postpartum al gemenstrueerd heeft. Kies anders voor Nee

Incontinentie?	peri23-80986	Vul hier ja in als uw patiënt 6 weken postpartum last heeft van enige vorm van incontinentie voor flatus, en/of faeces en/of urine. Kies anders voor Nee
Incontinentie	peri23-80859	Kies uit de waardelijst de soort incontinentie waar uw patiënt last van heeft.
Episiotomie/ruptuur	peri23-80860	Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop de episiotomie en/of ruptuur bij de nacontrole is genezen
Sectiowond	peri23-80984	Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop de sectio wond bij de nacontrole is genezen.
Bloeddruk	peri23-80852	
Bloeddruk systolisch	peri23-80853	Vul hier de systolische bloeddruk in, gemeten 6 weken postpartum
Bloeddruk diastolisch	peri23-80854	Vul hier de diastolische bloeddruk in, gemeten 6 weken postpartum
Hb	peri23-80855	Vul hier, bij de nacontrole, het Hb in
Bijzonderheden	peri23-80863	Hier kunt u, in vrije tekst, de bijzonderheden van de nacontrole beschrijven.